

Suivi des populations témoins de saumon atlantique au Québec : rapport scientifique 2021

7 février 2022

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS



Photographie de la page couverture :

William Cayer-Blais

Vanessa Cauchon

© Gouvernement du Québec

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022

ISBN (PDF) : 978-2-550-91888-2

Remerciements

Nous tenons à remercier les dirigeants et le personnel de la Société de gestion des rivières de Gaspé et ceux de la Société d'aménagement de Baie-Trinité, le St. John Salmon Club de la rivière Saint-Jean ainsi que les pêcheurs de ces deux rivières qui nous ont appuyés dans la réalisation des travaux sur le terrain. Nous remercions également tout le personnel de l'équipe technique qui a manifesté beaucoup d'enthousiasme dans l'accomplissement de ses tâches. Cette collaboration active qui a pour but de faciliter notre travail sur ces rivières et de favoriser la collecte des meilleurs renseignements possibles contribue directement à accroître nos connaissances, une étape indispensable à la conservation et à la gestion éclairée du saumon atlantique au Québec.

Réalisation

Gestionnaire responsable : Isabel Thibault
Chef du Service de la gestion des espèces aquatiques
Secteur de la faune et des parcs

Analyses et rédaction : Vanessa Cauchon, technicienne de la faune
Julien April, biologiste, Ph. D.

Échantillonnage : William Cayer-Blais, technicien de la faune
Jérôme Légaré, technicien de la faune
Ariel Arsenault, technicienne de la faune
Vanessa Laplante, technicienne de la faune
Guillaume Canac-Marquis, technicien de la faune
Émile Langevin, étudiant
Timothé Therrien, étudiant
Gabriel Guité LeBlanc, stagiaire et étudiant
Charles Pelletier, étudiant
Thomas Gagnon, stagiaire

Soutien en coordination : Charlène Lavallée, biologiste
Maxime Guérard, biologiste
Marie-France Barrette, biologiste

Conception graphique : Vanessa Cauchon, technicienne de la faune

Lecture d'écaillés : Denise Deschamps, technicienne de la faune
Vanessa Cauchon, technicienne de la faune

Traitement de texte : Vanessa Cauchon, technicienne de la faune

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Direction générale de la gestion de la faune et des habitats

Direction de l'expertise sur la faune aquatique

880, chemin Sainte-Foy, 4^e étage

Québec (Québec) G1S 4X4

Téléphone : 418 627-8694

Résumé

Le suivi intensif des populations de saumon atlantique de la rivière Saint-Jean en Gaspésie et de la rivière de la Trinité sur la Côte-Nord a débuté il y a plus de 40 ans. L'objectif du projet consiste essentiellement à décrire l'évolution de l'abondance, des caractéristiques, des taux de survie en rivière et des taux de retour de la mer de ces deux populations naturelles. Ces données servent ensuite à mieux comprendre les causes des changements de la dynamique des populations et à guider les choix de gestion. Dans l'ensemble, la tendance à la baisse de plusieurs indicateurs populationnels confirme que le saumon atlantique requiert des efforts de conservation. Heureusement, une importante diminution des prélèvements par la pêche au cours des dernières décennies accompagnée d'une stabilisation relative des taux de survie en mer ont permis aux deux rivières témoins de se maintenir au-delà du seuil de conservation démographique.

De façon générale, si une diminution significative de l'abondance des smolts ainsi que des adultes (madeleineaux et rédibermarins) a été observée depuis les années 1980 dans les deux rivières, ces tendances se sont atténuées au fil des années. La seule exception concerne l'abondance des smolts dans la rivière Saint-Jean qui continue de décroître. Le nombre de madeleineaux est quant à lui demeuré stable dans la rivière Saint-Jean depuis les années 1980. En 2021, les smolts en dévalaison se chiffraient à 60 655 individus dans la rivière Saint-Jean, alors que dans la rivière de la Trinité, ce sont 42 679 smolts qui ont migré vers la mer, ce qui est supérieur à la moyenne des 5 années précédentes. La diminution du nombre de smolts est accompagnée de faibles variations temporelles de longueurs et de poids, le facteur de condition global diminuant au fil du temps dans la rivière Saint-Jean. Le nombre d'adultes en montaison en rivière en 2021, à la suite d'une période d'alimentation en mer, a été de 1 246 saumons dans la rivière Saint-Jean et de 868 saumons dans la rivière de la Trinité, ce qui est largement supérieur à la moyenne quinquennale. Cela est en grande partie dû à l'excellent retour des madeleineaux.

Le taux de survie en rivière, de l'œuf au smolt, affiche une diminution historique significative avec le temps dans la rivière Saint-Jean (1,13 %; moyennes historiques : 2,22 %). Dans la rivière de la Trinité, le taux de survie de l'œuf au smolt ne présente pas de tendance significative depuis les années 1980. Pour cette rivière, le taux de survie de l'œuf au smolt de la cohorte de 2015 a atteint 3,01 %, alors que la moyenne historique est de 2,26 %. À plus courte échelle temporelle, soit depuis 2000, les tendances de survie en rivière demeurent semblables aux tendances historiques, soit en diminution dans la rivière Saint-Jean et stable dans la rivière de la Trinité.

En ce qui concerne la phase de vie en mer, les taux de retour sont demeurés plutôt stables dans les deux rivières depuis 2000. Une diminution historique significative du taux de retour, du smolt à l'adulte, est néanmoins observée dans la rivière de la Trinité, pour laquelle nous possédons la plus longue série de données (cohorte 2019 : 1,09 %; moyenne historique : 2,07 %). Une tendance à l'augmentation dans les taux de retour est observée dans la rivière Saint-Jean depuis les années 1980 (cohorte 2018 : 2,53 %; moyenne historique : 1,43 %).

Table des matières

Introduction.....	10
Importance des suivis fauniques	10
Situation du saumon atlantique	10
Suivi de deux rivières témoins pour le saumon atlantique au Québec.....	11
Méthodologie	12
Zone d'étude et données environnementales.....	12
Échantillonnage des smolts en dévalaison et des adultes en montaison.....	13
Échantillonnage des smolts en dévalaison	13
Échantillonnage des saumons adultes en montaison	14
Calcul des taux de survie en rivière et des taux de retour de la mer.....	15
Statistiques	16
Résultats.....	17
Conditions environnementales	17
Dévalaison des smolts	17
Période de dévalaison.....	17
Abondance de smolts.....	17
Caractéristiques des smolts	18
Montaison des adultes	19
Pêche sportive	19
Montaison des adultes	19
Caractéristiques des adultes	20
Nombre d'œufs déposés	21
Taux de survie en rivière et taux de retour de la mer	21
Survie en rivière, de l'œuf au smolt	21
Taux de retour de la mer, du smolt à l'adulte.....	22
Discussion	23
Conclusion.....	24
Glossaire	25
Liste des références	26
Tableaux.....	30
Figures	56

Liste des tableaux

Tableau I.	Captures de smolts en dévalaison printanière dans la rivière Saint-Jean en 2021	31
Tableau II.	Captures de smolts en dévalaison printanière dans la rivière de la Trinité en 2021	32
Tableau III.	Caractéristiques des smolts dans la rivière Saint-Jean en 2021	33
Tableau IV.	Caractéristiques des smolts dans la rivière de la Trinité en 2021	34
Tableau V.	Estimation de la dévalaison et caractéristiques des smolts de la rivière Saint-Jean de 1989 à 2021 et de la rivière de la Trinité de 1984 à 2021	35
Tableau VI.	Bilan de l'exploitation des saumons dans la rivière Saint-Jean de 1984 à 2021	37
Tableau VII.	Bilan de l'exploitation des saumons dans la rivière de la Trinité de 1984 à 2021	39
Tableau VIII.	Montaison totale des saumons par catégorie de groupe d'âge en mer dans la rivière Saint-Jean de 1984 à 2021	41
Tableau IX.	Montaison totale des saumons par catégorie de groupe d'âge en mer dans la rivière de la Trinité de 1984 à 2021	43
Tableau X.	Caractéristiques des ombles de fontaine anadromes dans la passe migratoire de la rivière de la Trinité de 1997 à 2021	45
Tableau XI.	Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière Saint-Jean en 2021	46
Tableau XII.	Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière de la Trinité en 2021	47
Tableau XIII.	Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière Saint-Jean de 1983 à 2021	48
Tableau XIV.	Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière de la Trinité de 1980 à 2021	50
Tableau XV.	Survie en rivière, de l'œuf au smolt, dans la rivière Saint-Jean de 1985 à 2021	52
Tableau XVI.	Survie en rivière, de l'œuf au smolt, dans la rivière de la Trinité de 1980 à 2021	53
Tableau XVII.	Taux de retour de la mer, du smolt jusqu'à l'adulte, dans la rivière Saint-Jean de 1989 à 2021	54
Tableau XVIII.	Taux de retour de la mer, du smolt jusqu'à l'adulte, dans la rivière de la Trinité de 1984 à 2021	55

Liste des figures

Figure 1.	La rivière Saint-Jean dans son contexte géographique.....	57
Figure 2.	La rivière de la Trinité dans son contexte géographique	58
Figure 3.	Précipitations et température journalière de l'eau des rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021	59
Figure 4.	Évolution de la dévalaison des smolts dans la rivière Saint-Jean en 2021	60
Figure 5.	Évolution de la dévalaison des smolts dans la rivière de la Trinité en 2021	61
Figure 6.	Comparaison de la longueur totale moyenne journalière des smolts des rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021	62
Figure 7.	Classes de longueur des smolts mesurés vivants et intervalles de classes de longueur en fonction de l'âge des smolts échantillonnés dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021	63
Figure 8.	Abondance des madeleineaux et des rédibermarins dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité de 1984 à 2021	64
Figure 9.	Nombre d'ombles de fontaine anadromes en montaison enregistrés annuellement à la passe migratoire, présentés par classes de taille, dans la rivière de la Trinité de 1985 à 2021 ...	65
Figure 10.	Nombre d'ombles chevaliers anadromes en montaison enregistrés annuellement à la passe migratoire de la rivière de la Trinité de 1999 à 2021	65
Figure 11.	Nombre d'ombles de fontaine et d'ombles chevaliers en montaison enregistrés quotidiennement à la passe migratoire de la rivière de la Trinité en 2021	66
Figure 12.	Classes de longueur et intervalles de classes de longueur en fonction de l'âge des saumons adultes échantillonnés dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021	67
Figure 13.	Poids moyen des saumons des rivières Saint-Jean et de la Trinité de 1983 à 2021	68
Figure 14.	Longueur à la fourche moyenne des saumons des rivières Saint-Jean et de la Trinité de 1983 à 2021	69
Figure 15.	Taux de survie en rivière, de l'œuf au smolt, dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité..	70
Figure 16.	Taux de retour de la mer, du smolt à l'adulte, dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité	71

Liste des annexes

(SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE)

- Annexe I. Mesures des précipitations ainsi que de la température et du niveau de l'eau de la rivière Saint-Jean en 2021
- Annexe II. Mesures des précipitations ainsi que de la température et du niveau de l'eau de la rivière de la Trinité en 2021
- Annexe III. Relation longueur-poids des smolts des rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021
- Annexe IV. Caractéristiques des ombles chevaliers échantillonnés en dévalaison dans la rivière de la Trinité de 1998 à 2021
- Annexe V. Inventaire des reproducteurs dans la rivière Saint-Jean en 2021
- Annexe VI. Distribution des saumons à mi-saison, par secteur, dans la rivière Saint-Jean de 1989 à 2021

Introduction

Importance des suivis fauniques

Le suivi serré de certaines populations animales de référence représentatives de la situation générale de l'espèce est un outil essentiel pour assurer une saine gestion de la faune. En effet, l'analyse de données rigoureuses amassées sur plusieurs années permet notamment d'orienter les mesures de conservation et de mise en valeur, ce qui est primordial dans le cas d'espèces à la fois exploitées et en situation globalement préoccupante, comme le saumon atlantique.

Des suivis rigoureux de systèmes témoins sont effectués chez plusieurs populations de poissons, plus particulièrement chez les salmonidés, et ce, partout dans le monde (ex. : Grant et coll., 2007; DFO, 2008; ICES, 2021). Ces suivis permettent d'évaluer les effets des changements climatiques (Gurney et coll., 2008), de l'arrivée d'un compétiteur ou d'un nouveau parasite (Miller et Vincent, 2008) et des différentes actions humaines comme la pollution ou l'exploitation (Bickham et coll., 2000; Conover et Munch, 2002; Conover et coll., 2009) sur les populations naturelles. Les suivis permettent également d'évaluer l'évolution d'indices clés de l'état de santé des populations naturelles, telle la diversité génétique. En effet, des changements dans la diversité génétique d'une population peuvent se faire sentir bien avant l'observation de changements dans l'abondance des individus, ce qui permet de réagir avant qu'un réel déclin ne survienne (Shrimpton et Heath, 2003; Schwartz et coll., 2006; Hoffmann et Willi, 2008). De plus, le suivi de populations témoins permet une gestion plus prédictive des stocks par l'élaboration de modèles de dynamique des populations (Ricker, 1954; Beverton et Holt, 1957) parfois appliqués aux salmonidés (Caron et coll., 1999; Legault, 2005; Gibson et coll., 2008). Plus récemment, les séries de données historiques tirées de suivis annuels de populations témoins ont permis d'effectuer des analyses de viabilité de populations (AVP) (Legault, 2005; Gibson et coll., 2008; Palstra et Dionne, 2011). Ces analyses plus complexes intègrent des paramètres relatifs à la dynamique des populations, et parfois aux composantes génétiques, afin de mieux prédire l'évolution de l'abondance, des caractéristiques des populations cibles ainsi que leur probabilité d'extinction, ce qui aide à orienter les décisions de gestion.

En résumé, le suivi étroit de populations témoins offre des séries de données historiques qui permettent de : 1) déterminer les conséquences potentielles des changements environnementaux et des activités humaines sur les populations; 2) signaler de nouveaux stressseurs (pollution, parasites, etc.) avant qu'ils aient une incidence réelle; 3) suivre les paramètres de santé des stocks tels que la diversité génétique et les taux de survie annuels, et ce, pour adapter les orientations de gestion de façon appropriée au moment opportun; 4) concevoir de nouveaux outils complémentaires tenant compte de l'évolution constante des populations de façon à favoriser une gestion prédictive des stocks exploités.

Situation du saumon atlantique

L'abondance des saumons adultes en rivière a graduellement diminué au cours des dernières décennies sur toute l'aire de répartition de l'espèce (Parrish et coll., 1998; WWF, 2001; ICES, 2021). Au Québec, selon nos estimations, leur nombre est passé d'environ 120 000 saumons adultes en moyenne durant les années 1980 à environ 66 000 saumons en moyenne depuis les années 2010 dans les 114 rivières à saumon suivies sur le territoire, une diminution touchant particulièrement les rédibermarins (ICES,

2021; MFFP, 2021). Certaines populations du sud de l'aire de répartition, telles les populations de la baie de Fundy intérieure, ont été déclarées en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC, 2011). Au Québec, le saumon de la plupart des régions a obtenu le statut de « préoccupant », alors qu'il a été déclaré en voie de disparition sur l'île d'Anticosti lors de l'évaluation de 2011 du COSEPAC. À une échelle plus fine, on constate néanmoins que plusieurs populations de saumons du Québec demeurent dans un état exceptionnel. Dans ce contexte, il devient important de poursuivre les efforts de suivis serrés de populations modèles pour mieux comprendre les effets des variations environnementales et humaines sur l'intégrité des stocks de saumon atlantique pour ainsi adapter les orientations de mise en valeur et de conservation en fonction de l'état actuel de l'espèce.

Suivi de deux rivières témoins pour le saumon atlantique au Québec

Le suivi de deux rivières témoins a débuté il y a plus de 40 ans au Québec dans deux régions géographiques et génétiques distinctes : la rivière Saint-Jean en Gaspésie et la rivière de la Trinité sur la Côte-Nord. L'objectif principal de ces travaux est d'obtenir une série de données historiques permettant de suivre l'évolution de la dynamique de deux populations naturelles modèles appartenant à deux régions distinctes du Québec. Plus précisément, ces travaux visent à suivre l'évolution de l'abondance et des caractéristiques phénotypiques des jeunes en dévalaison et des adultes en montaison. Également, ce projet vise à suivre l'évolution des taux de survie en rivière et des taux de retour de la mer dans le but d'évaluer l'état de ces populations témoins, de déterminer les facteurs potentiellement responsables des fluctuations observées et, ultimement, de fournir des données fiables pour orienter les mesures de gestion des rivières à saumon du Québec.

Méthodologie

Zone d'étude et données environnementales

Deux populations de saumon atlantique appartenant à deux régions géographiques et génétiques distinctes sont suivies annuellement, la première dans la rivière Saint-Jean, à l'extrémité est de la Gaspésie (48,76889°, -64,44750°, figure 1), et la deuxième dans la rivière de la Trinité, sur la Haute-Côte-Nord, à mi-chemin entre les villes de Baie-Comeau et de Port-Cartier (49,41806°, -67,30444°, figure 2).

La rivière Saint-Jean est la plus grande des deux rivières témoins : elle draine un bassin de 1 122 km² et la longueur de son cours principal, depuis sa source jusqu'à son embouchure, est de 109 km. La superficie totale de la rivière accessible au saumon est estimée à 2,25 millions de mètres carrés et le nombre d'unités de production (UP) est de 1,61 million. Le seuil de conservation optimal de la population de la rivière Saint-Jean est de 2,12 millions d'œufs et le seuil de conservation démographique, de 0,79 million d'œufs (Caron et coll., 1999; Dionne et coll., 2015). La rivière coule sur de la roche sédimentaire calcaire, ce qui contribue à donner une grande conductivité à l'eau et à maintenir le pH basique. L'écoulement de la rivière est rapide sur toute sa longueur; la granulométrie grossière et les faciès d'écoulement dominants sont les seuils. Dans la partie inférieure de son cours, la roche mère domine dans plusieurs sections. En amont de la limite de la zone d'influence des marées, à 5 km de la mer, la rivière se divise en un réseau de canaux, dont les plus importants peuvent être presque complètement obstrués par des embâcles naturels de troncs d'arbres. Un embâcle d'environ 1,5 km a d'ailleurs été démantelé en 2015 pour préserver le libre passage du poisson. Finalement, la rivière forme un barachois de 5,4 km² soumis à l'influence des marées, pour ensuite se jeter dans la mer. La très grande partie du bassin de drainage est couverte d'une sapinière à bouleau jaune, dans la partie en aval de la rivière, et d'une sapinière à bouleau blanc, dans la partie en amont.

La rivière de la Trinité, quant à elle, draine un bassin de 551 km², soit environ la moitié de la taille de celui de la Saint-Jean, et se jette directement dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. La longueur de son cours principal est de 75 km, mais le saumon fréquente uniquement les 70 premiers kilomètres. Un barrage est situé à environ 150 m de l'embouchure et les saumons utilisent une passe migratoire pour franchir l'obstacle. La superficie totale de la rivière accessible au saumon est estimée à 1,92 million de mètres carrés et le nombre d'UP est de 0,99 million, soit environ les deux tiers du nombre d'unités de la rivière Saint-Jean. Les seuils de conservation optimal et démographique pour la population de la rivière de la Trinité sont de 1,66 million d'œufs et de 0,61 million d'œufs, respectivement (Caron et coll., 1999; Dionne et coll., 2015). La rivière coule sur les roches granitiques du Bouclier canadien. La conductivité de l'eau est faible et le pH est acide. La rivière est marquée par une succession d'écoulements rapides et plus lents; le sable y est omniprésent, sauf dans les zones d'écoulement rapide. L'ensemble du bassin de drainage est couvert d'une sapinière à bouleau blanc.

Outre le saumon atlantique, l'omble de fontaine (*Salvelinus fontinalis*), l'anguille d'Amérique (*Anguilla rostrata*) et l'épinoche à trois épines (*Gasterosteus aculeatus*) fréquentent les deux rivières. La lamproie marine (*Petromyzon marinus*) fraie aussi dans la rivière Saint-Jean, mais on ne possède pas de données sur cette espèce pour la rivière de la Trinité. Les autres espèces sont très rares ou limitées à des habitats

particuliers. Dans la rivière Saint-Jean, par exemple, des gaspareaux (*Alosa pseudoharengus*) et quelques spécimens de truites arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*) ont été capturés. Dans la rivière de la Trinité, on trouve une population d'ombles chevaliers anadromes (*Salvelinus alpinus*), de meuniers rouges (*Catostomus catostomus*), de meuniers noirs (*Catostomus commersoni*), d'épinoches à quatre épines (*Apeltes quadracus*) et d'épinoches à neuf épines (*Pungitius pungitius*).

Les deux rivières présentent des régimes hydriques et thermiques différents. La débâcle et le réchauffement printanier se produisent généralement plus tôt dans la rivière Saint-Jean que dans la rivière de la Trinité. Des données sur la température de l'eau sont recueillies quotidiennement durant toute l'année par un thermographe dans les deux rivières témoins ($\pm 0,1$ °C, figure 3). Finalement, des mesures quotidiennes de précipitations à l'aide d'un pluviomètre ($\pm 0,5$ mm) et du niveau de l'eau à l'aide d'une règle ($\pm 0,5$ cm) sont effectuées dans les deux rivières.

Échantillonnage des smolts en dévalaison et des adultes en montaison

Échantillonnage des smolts en dévalaison

L'estimation du nombre de smolts se fait par la méthode de capture-recapture. Généralement, cette méthode exige que les smolts soient d'abord capturés dans une zone de capture, marqués (M), dans ce cas-ci par l'ablation de la nageoire adipeuse, et relâchés. Ensuite, une zone de recapture, située en aval, permet la capture (C) et l'observation du nombre d'individus marqués recapturés (R). La section de rivière située entre les deux zones permet un mélange homogène des smolts capturés et non capturés dans la zone de capture. Finalement, la taille de la population de smolts en dévalaison (N) est évaluée à l'aide de l'estimateur de Petersen (modifié par Chapman, 1951) de la façon suivante :

$$N = [(M + 1) (C + 1)] / (R + 1) \text{ (Ricker, 1980)}$$

Jusqu'en 2020, sur la rivière Saint-Jean, une barrière de comptage munie d'un piège et couvrant près de la moitié de la rivière servait d'engin de pêche à la zone de capture au kilomètre 8 (kilomètres de rivière depuis l'eau saumâtre). Des travaux de réfraction de la structure de comptage ont débuté au cours de l'été 2020 et sont toujours en cours, rendant la barrière inopérante. De ce fait, la zone de recapture, située au kilomètre 6,5, qui est munie de deux trappes rotatives installées côte à côte, a servi à la fois de zone de capture et de zone de recapture en 2021. Ainsi, les smolts non marqués capturés dans les trappes rotatives étaient transportés jusqu'à l'ancien lieu de capture, marqués et relâchés. Sur la rivière de la Trinité, une première trappe rotative est installée dans la zone de capture au kilomètre 9 et une seconde est mise à l'eau dans la zone de recapture au kilomètre 3,2.

En vue de déterminer la longueur des smolts en dévalaison dans chacune des rivières, la longueur totale de 50 smolts vivants choisis au hasard est mesurée quotidiennement. De plus, dans l'objectif de décrire plus précisément les caractéristiques des smolts en dévalaison, environ 150 d'entre eux sont prélevés dans la zone de recapture selon la proportion des captures journalières, et ce, pour mesurer la longueur totale, la longueur à la fourche (± 1 mm) et le poids ($\pm 0,1$ g), pour noter le sexe et prélever des écailles en vue de déterminer l'âge des individus.

Dans le but d'étudier l'évolution des caractéristiques génétiques des deux populations témoins, un morceau de nageoire adipeuse est prélevé sur 100 des smolts déjà échantillonnés et répartis sur

l'ensemble de la période de dévalaison annuellement. Les tissus sont conservés dans de l'éthanol à 95 %.

Un suivi plus élaboré et des projets d'acquisition de connaissances sur l'omble de fontaine anadrome ont été entrepris sur la rivière de la Trinité depuis 2020. En 2021, des mesures et des prélèvements ont été faits sur les ombles de fontaine capturés dans les trappes rotatives afin d'élaborer des outils nous permettant de distinguer les ombles de fontaine migrants (anadromes) des ombles résidents. Pour ce faire, à la zone de capture, les ombles de fontaine ont été mesurés à la fourche, pour un maximum de 50 par jour, pour ensuite être tous marqués par l'ablation de la nageoire adipeuse et relâchés. À la zone de recapture, les ombles de fontaine non marqués et les recaptures ont été dénombrés, la longueur à la fourche des recaptures a été prise, et un échantillonnage aléatoire de 30 ombles de fontaine non marqués et de 30 recaptures a été effectué parmi les captures. La prise du poids, du sexe et d'une série de 10 mesures morphométriques précises pouvant aider à différencier l'écotype de même que le prélèvement de chair pour la génétique, d'écaillés et des otolithes ont été effectués sur ces spécimens.

Échantillonnage des saumons adultes en montaison

Dans la rivière Saint-Jean, le dénombrement des adultes se fait en apnée à la fin de la période de montaison. Un classement par catégorie (madeleineaux et rédibermarins) est alors effectué. Cela représente le nombre minimal de géniteurs fréquentant la rivière, puisqu'aucun ajustement n'est fait pour tenir compte des poissons ayant pu échapper aux observateurs ou se trouvant dans des secteurs non couverts par les décomptes ou encore pour ceux qui peuvent entrer en rivière après le dénombrement de fin de saison. Le nombre total de saumons revenus en rivière est ensuite obtenu par l'ajout de tous les poissons capturés et gardés ou trouvés morts dans la rivière avant l'inventaire. La prise de données morphométriques (longueur à la fourche, poids et sexe) et le prélèvement d'écaillés sont effectués au cours de l'enregistrement des captures par la pêche sportive et sur les saumons trouvés morts. Dans cette rivière, un contingent de 50 grands saumons peut être conservé à la pêche sportive à partir du 1^{er} août à condition qu'un nombre suffisant de géniteurs soit atteint durant le décompte de mi-saison. Les années où le nombre minimal de géniteurs n'est pas atteint, il en résulte un manque de données morphométriques sur les grands saumons. Pour contrer cette lacune, des petits coffres d'échantillonnage ont été fournis aux guides de pêche afin qu'ils prélèvent des écaillés et prennent une mesure de longueur à la fourche sur les grands saumons remis à l'eau.

Dans la rivière de la Trinité, le dénombrement des saumons est effectué lors de leur passage dans une passe migratoire. La longueur totale de chaque saumon est estimée grâce à une règle, graduée tous les 10 cm, située sur le plancher de la cage de rétention. La date ainsi que l'heure de passage sont également notées. Les spécimens de moins de 65 cm sont classés dans la catégorie des madeleineaux, les autres, dans celle des rédibermarins. Le nombre total de saumons revenus en rivière est ensuite obtenu en ajoutant aux montaisons de la passe migratoire toutes les captures sportives et les saumons trouvés morts en aval de la passe migratoire. La prise de mesures morphométriques plus détaillée (longueur à la fourche, longueur totale, poids et sexe) ainsi que le prélèvement d'écaillés et d'un bout de nageoire adipeuse sont effectués sur les madeleineaux au cours de l'enregistrement des captures sportives et sur les poissons trouvés morts. Depuis 2002, à l'exception de 2003, la remise à l'eau de tous les rédibermarins est obligatoire dans cette rivière. Dans le but de recueillir des données sur les caractéristiques de ces derniers, ils sont échantillonnés dans la passe migratoire lors de leur passage.

La longueur à la fourche est mesurée, des écailles sont prélevées pour la détermination de l'âge et un bout de nageoire adipeuse est conservé pour l'analyse génétique.

Les poissons d'autres espèces telles que les ombles de fontaine et les ombles chevaliers sont également dénombrés et mesurés lors de leur passage. D'ailleurs, depuis 2020, un suivi plus précis de l'omble de fontaine anadrome est effectué. Pour mieux quantifier et couvrir l'ensemble de la montaison des ombles de fontaine anadromes, la période d'opération de la passe migratoire a été prolongée jusqu'au 30 septembre, permettant ainsi le dénombrement et la mesure de tous les individus. De plus, en vue de recueillir des données morphométriques, génétiques et d'âge, un échantillonnage plus spécifique a été réalisé sur une partie des ombles capturés à la pêche sportive. Des données sur le poids (plein et vide), les longueurs (totale, à la fourche et de la tête), le sexe et la maturité des gonades ont été recueillies. Le prélèvement de chair pour la génétique et d'otolithes pour la détermination de l'âge, l'historique des migrations et le rétrocalcul des tailles ont également été faits.

Depuis 2016, le calcul du nombre de reproducteurs intègre un facteur de correction qui permet de prendre en considération une certaine mortalité associée à la remise à l'eau. Un taux de mortalité à la remise à l'eau de 7 % est donc dorénavant appliqué en vue d'évaluer plus précisément la déposition d'œufs en rivière. Dans la rivière Saint-Jean, ce pourcentage est appliqué uniquement sur les poissons remis à l'eau après le dénombrement de fin de saison.

Calcul des taux de survie en rivière et des taux de retour de la mer

Les évaluations annuelles du nombre de smolts en dévalaison et d'adultes en montaison nous permettent d'estimer les taux de survie en rivière, soit de l'œuf au smolt, de même que les taux de retour de la mer, du smolt à l'adulte.

L'estimation du taux de survie en rivière s'effectue par la comparaison du nombre d'œufs déposés en rivière par une cohorte donnée au nombre de smolts de cette même cohorte qui dévalent la rivière quelques années plus tard. Le nombre d'œufs déposés au cours d'une année donnée est calculé en fonction du nombre de femelles de retour en rivière, de leur poids ainsi que du nombre moyen d'œufs par kilogramme par femelle (madeleineaux : 2 025 œufs/kg; rédibermarins : 1 745 œufs/kg; Leclerc, 2015). Les œufs déposés en rivière deviennent des smolts qui ne migrent pas tous la même année vers la mer. Pour calculer le nombre de smolts produits par le frai d'une année, par exemple celui de 2015, il faut additionner le nombre de smolts de 2 ans en 2018, de 3 ans en 2019, de 4 ans en 2020 et de 5 ans en 2021. La majorité des smolts des deux rivières témoins migrent vers la mer à l'âge de 3 ans et très peu dévalent à l'âge de 5 ans.

Les smolts qui migrent vers la mer ne reviennent pas tous la même année; les madeleineaux reviennent un an plus tard et les dibernmarins, deux ans après leur départ de la rivière. Dans les deux rivières témoins, très peu de saumons demeurent trois ans en mer avant de revenir frayer une première fois, et on y retrouve également peu de saumons à frai antérieur. La majorité des saumons revient dans la rivière Saint-Jean après un séjour de deux ans en mer, alors que dans la rivière de la Trinité, la majorité revient après une seule année en mer. Un plus long séjour en mer se fait au détriment de la probabilité de survie, mais à leur retour, ces saumons sont de plus grande taille et ont une fécondité moyenne plus élevée que ceux ayant passé un an en mer. Le taux de retour à la suite du séjour en mer de chaque cohorte de

smolts est calculé par la comparaison du nombre de smolts en dévalaison pour une année donnée, estimé par la méthode de capture-recapture, au nombre d'adultes de cette même cohorte qui retournent en rivière un an, deux ans et trois ans plus tard, selon les lectures d'âge.

Statistiques

L'évolution de l'abondance des smolts et des adultes dans le temps, de leur taille, de leur facteur de condition ainsi que de la proportion de femelles a été testée par des modèles de régression linéaire dans les deux rivières témoins. Dans le but de présenter le plus fidèlement possible l'évolution temporelle des caractéristiques morphométriques des saumons (poids, longueurs, rapports des sexes, facteur de condition), les années où le nombre d'individus échantillonnés ne permettait pas une représentation adéquate de la population ($N < 10$) ont été exclues des analyses. La régression linéaire a également été utilisée pour évaluer l'évolution de l'âge moyen des smolts et la déposition d'œufs. L'évolution des taux de survie en rivière ainsi que des taux de retour de la mer depuis les années 1980 et les années 2000 a aussi été évaluée à l'aide de modèles de régression linéaire dans les deux rivières témoins. Les autres modèles de régression, tels les modèles quadratiques, logistiques, logarithmiques et cycliques, ont par ailleurs été testés et comparés au modèle linéaire à l'aide de l'approche par sélection de modèles basée sur le critère d'information Akaike (AIC).

Résultats

Conditions environnementales

En 2021, le réchauffement printanier a été particulièrement hâtif dans les deux rivières témoins. L'eau a atteint 9,3 °C aussi tôt que le 14 mai dans la rivière Saint-Jean, et la température est demeurée supérieure à la moyenne jusqu'au 10 juin pour ensuite se situer près des normales saisonnières (figure 3). Dès le début de la saison, le niveau d'eau a été sous le niveau normalement observé jusqu'au début de septembre, mis à part une crue survenue au début de juillet, sans toutefois atteindre des niveaux d'étiage. Dans la rivière de la Trinité, l'eau a atteint les 10 °C le 16 mai, et la température est demeurée particulièrement élevée jusqu'à la mi-juin pour ensuite revenir près des normales saisonnières. Un épisode d'eau chaude (jusqu'à 23°C) est néanmoins survenu au cours du mois d'août. Le niveau d'eau était, quant à lui, exceptionnellement bas pendant la dévalaison, mais il est revenu près du niveau moyen dès la fin de juin pour fluctuer sporadiquement selon les précipitations reçues (figure 3).

Dévalaison des smolts

Période de dévalaison

Le déclenchement de la dévalaison coïncide avec le réchauffement printanier et se produit habituellement lorsque la température de l'eau approche les 10 °C, malgré que d'autres facteurs influencent également le moment de la dévalaison. Celle-ci se produit toujours plus tôt dans la rivière Saint-Jean que dans la rivière de la Trinité. En 2021, dans la rivière Saint-Jean, la dévalaison a possiblement débuté deux jours avant que l'installation des trappes ait été possible, soit le 13 mai, et s'est terminée le 17 juin (tableau I), pour se concentrer principalement du 15 mai au 6 juin. Dans la rivière de la Trinité, la dévalaison a débuté aussi tôt que le 19 mai pour se poursuivre jusqu'au 25 juin. Les captures, elles, se sont concentrées du 22 mai au 8 juin (tableau II).

Abondance de smolts

Les données sur le nombre de captures et de smolts marqués quotidiennement sont présentées dans les tableaux I et II ainsi que dans les figures 4 et 5. Dans la rivière Saint-Jean, le nombre de captures s'élevait à 195 smolts dès la première journée de capture, ce qui peut laisser supposer que nous avons manqué le début de la dévalaison. Nous avons tenté d'estimer cette période en réalisant un gradient de captures basé sur la température de l'eau et en utilisant le taux de recapture moyen de smolts des trois premiers jours. D'autre part, le mal fonctionnement des trappes rotatives les 24 et 25 mai, alors que les captures étaient à leur sommet d'abondance, ont pu entraîner un biais dans nos estimations. La trappe la plus efficace était complètement inopérante le 25 mai. Pour cette raison, nous avons estimé le nombre de smolts qui auraient potentiellement été capturés dans celle-ci en fonction du taux d'efficacité moyen de chacune des trappes le jour précédant et suivant la période de mal fonctionnement. Le nombre de recaptures potentielles pour la trappe inopérante a également été estimé de la même façon, soit en utilisant le taux de recapture moyen le jour précédant l'arrêt et le surlendemain, puisque le faible nombre de smolts marqués le 25 mai influe sur le taux de recapture du lendemain. Le nombre de smolts ayant descendu la rivière au printemps 2021 est donc évalué à 60 655, soit 19 % sous la moyenne historique, mais 47 % au-dessus la moyenne quinquennale. Dans la rivière de la Trinité, la dévalaison printanière est évaluée à 42 679 smolts, soit 13 % sous la moyenne historique, mais 24 % au-dessus de la moyenne

quinquennale. Depuis les années 1980, l'abondance des smolts en dévalaison a diminué significativement dans les deux rivières témoins (Saint-Jean : $r^2 = 0,48$, $p < 0,0001$; de la Trinité : $r^2 = 0,45$, $p < 0,0001$).

Caractéristiques des smolts

Les caractéristiques des smolts échantillonnés en 2021 sont présentées dans les tableaux III et IV. Nous obtenons la longueur totale moyenne des smolts à partir des poissons échantillonnés et, plus précisément, de ceux mesurés vivants et remis à l'eau. Dans la rivière Saint-Jean, la longueur totale moyenne des 1 261 smolts mesurés vivants est de 129 mm et celle des 1 223 smolts de la rivière de la Trinité, de 137 mm (figure 6). De façon générale, la longueur moyenne journalière des smolts a tendance à s'accroître durant la saison dans les deux rivières, ce que nous observons en 2021 (figure 6). Au cours des années, la longueur totale moyenne des smolts a grandement fluctué sans démontrer de tendance temporelle dans les deux rivières (Saint-Jean : $r^2 = 0,07$, $p = 0,13$; De la Trinité : $r^2 = 0,02$, $p = 0,42$).

On trouve annuellement une différence de taille, bien que minime, entre les smolts de ces deux rivières. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les smolts de la rivière Saint-Jean, dont la taille moyenne historique est de 126 mm, sont en moyenne plus âgés (3,37 ans) que ceux de la rivière de la Trinité (2,98 ans), qui sont pourtant de taille supérieure, mesurant en moyenne 133 mm (tableau V). Dans la rivière Saint-Jean, les smolts de 3 et 4 ans représentent 56 % et 37 % des individus de la dévalaison, alors que, dans la rivière de la Trinité, la classe d'âge de 3 ans domine nettement, avec 78 % de l'effectif.

La taille des smolts n'est donc pas nécessairement révélatrice de leur âge. En effet, la structure de taille présente une distribution normale sans égard à l'âge des smolts (figure 7). Également, la longueur totale des smolts n'est pas corrélée avec leur âge (Saint-Jean : $r^2 = 0,0006$, $p = 0,89$; de la Trinité : $r^2 = 0,002$, $p = 0,78$). L'âge moyen des smolts de la rivière Saint-Jean a diminué avec le temps, passant de 3,6 ans en moyenne au début des années 1990 à 3,3 ans en moyenne depuis les cinq dernières années ($r^2 = 0,28$, $p = 0,002$), alors que celui des smolts de la rivière de la Trinité est resté stable ($r^2 < 0,0001$, $p = 0,98$).

Le poids des smolts des deux rivières, tout comme leur longueur, est également resté stable au cours des années, malgré certaines fluctuations (Saint-Jean : $r^2 = 0,004$, $p = 0,72$; de la Trinité : $r^2 = 0,04$, $p = 0,25$). Les relations longueur-poids chez les smolts des deux rivières témoins sont linéaires. Le facteur de condition de Fulton (K) ($100\ 000 \times \text{poids}/\text{longueur}^3$; Thompson, 1942) donne un indice de la condition générale du poisson. Une valeur près de 1 indique une bonne condition d'embonpoint. En 2021, le K moyen était de 0,84 dans la rivière Saint-Jean et de 0,93 dans la rivière de la Trinité (moyennes historiques : 0,87 et 0,92, respectivement; tableau V). Le modèle de régression linéaire indique que le facteur de condition des smolts de la rivière Saint-Jean a diminué avec le temps ($r^2 = 0,34$, $p = 0,0004$), alors qu'il est resté stable dans la rivière de la Trinité ($r^2 = 0,08$, $p = 0,09$).

Chez les smolts, on trouve habituellement plus de femelles que de mâles. Des rapports des sexes respectifs de 70 % et de 67 % pour les femelles ont été observés dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021, la moyenne historique étant de 64 % pour les femelles dans la rivière Saint-Jean et de 60 % dans la rivière de la Trinité (tableau V). Néanmoins, sur le plan temporel, la proportion de femelles est stable dans le temps dans les deux rivières, avec une tendance à la hausse dans la rivière de la Trinité (Saint-Jean : $r^2 = 0,02$, $p = 0,42$; de la Trinité : $r^2 = 0,11$, $p = 0,04$).

Concernant les ombles de fontaine capturés et mesurés vivants dans les trappes rotatives, leur longueur à la fourche moyenne est de 143 mm, variant de 100 à 296 mm. Un total de 892 ombles de fontaine a été marqué à la zone de capture et 45 d'entre eux ont été recapturés en aval. Trente ombles de fontaine non marqués et 31 ombles recapturés ont été échantillonnés en vue de poursuivre des études sur les différences morphométriques entre écotypes.

Parmi les autres espèces capturées et d'intérêt, un total de 51 ombles chevaliers juvéniles a été capturé en 2021. Cette quantité relativement élevée est possiblement influencée par la mise à l'eau hâtive des trappes rotatives.

Montaison des adultes

Pêche sportive

Il a fallu aux pêcheurs 1 731 jours de pêche sur la rivière Saint-Jean pour récolter 179 madeleineaux et 16 rédibermarins et pour remettre à l'eau 945 saumons. Le succès de pêche est donc de 0,11 saumon gardé par jour ou de 0,66 saumon capturé (remis à l'eau ou non), alors que la moyenne des cinq dernières années est de 0,06 saumon par jour ou de 0,38 saumon capturé (tableau VI).

Sur la rivière de la Trinité, il a fallu 1 045 jours de pêche pour récolter 74 madeleineaux et 2 rédibermarins à la pêche sportive et pour remettre à l'eau 107 saumons. Cela représente un succès de pêche de 0,07 saumon gardé par jour ou 0,18 saumon capturé (remis à l'eau ou non), ce qui est largement supérieur aux moyennes des cinq dernières années de 0,05 saumon gardé et 0,09 saumon capturé (tableau VII). La pêche aux grands saumons étant interdite, il faut noter que c'est à la suite des lectures d'âge que deux saumons conservés de taille réglementaire ont été classés parmi les rédibermarins.

Une pêche sportive à l'omble de fontaine anadrome est pratiquée sur la rivière de la Trinité, grâce, entre autres, à l'existence d'un droit d'accès propre à cette espèce. En 2021, les pêcheurs auront passé 421 jours de pêche sur la rivière, exclusivement vouée à cette espèce, pour récolter 498 ombles de fontaine et remettre à l'eau un minimum de 155 ombles de fontaine.

Montaison des adultes

Dans la rivière Saint-Jean, le dénombrement des géniteurs en fin de saison s'est déroulé le 22 septembre, dans un niveau d'eau moyennement haut et une visibilité de bonne à moyenne. L'abondance estimée pour cette rivière est donc de 459 madeleineaux et de 787 rédibermarins pour un total de 1 246 saumons, ce qui représente une hausse de 40 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, principalement due au bon retour des madeleineaux, qui ont été jusqu'à 77 % plus abondants (tableaux VI et VIII). Dans la rivière de la Trinité, la montaison totale est de 868 saumons, soit 770 madeleineaux et 98 rédibermarins, ce qui est supérieur de 104 % à la moyenne des cinq dernières années pour la montaison totale, et ce, en raison du retour exceptionnel des madeleineaux surpassant de 185 % la moyenne quinquennale (tableaux VII et IX).

Historiquement, le nombre de madeleineaux dans la rivière Saint-Jean est resté stable ($r^2 < 0,0001$, $p = 0,97$), alors qu'il a diminué significativement avec le temps dans la rivière de la Trinité ($r^2 = 0,54$, $p < 0,0001$), plus particulièrement de 1990 à 1993 (figure 8). Le nombre de rédibermarins a par contre

diminué significativement depuis les années 1980 dans les deux rivières témoins (Saint-Jean : $r^2 = 0,28$, $p = 0,0003$; de la Trinité : $r^2 = 0,56$, $p < 0,0001$).

En ce qui concerne les autres espèces dénombrées dans la passe migratoire de la rivière de la Trinité, le nombre d'ombles de fontaine qui ont franchi la passe en 2021 est de 4 884 individus, ce qui est supérieur à la moyenne des cinq dernières années de 3 124 ombles de fontaine (figure 9 et tableau X). Quant aux ombles chevaliers, 46 ont été dénombrés dans la passe migratoire en 2021 (figure 10). Un spécimen de truite arc-en-ciel a également été intercepté dans la passe migratoire. La figure 11 présente les dates de montaison de l'omble de fontaine au cours de la saison et le tableau X présente les caractéristiques des ombles de fontaine en montaison.

Caractéristiques des adultes

Les caractéristiques des saumons adultes récoltés durant la saison 2021 sont présentées dans les tableaux XI et XII ainsi que dans les figures 12 à 14. La synthèse de ces données depuis 1980 est présentée dans les tableaux XIII et XIV.

Le poids moyen des madeleineaux en 2021 dans la rivière Saint-Jean est de 1,53 kg et de 1,61 kg dans la rivière de la Trinité, ce qui est inférieur à leur moyenne historique respective de 1,64 kg et de 1,67 kg (figure 13). La longueur des madeleineaux en 2021 est semblable à la moyenne dans les deux rivières (Saint-Jean : 55,5 cm, moyenne historique : 55,0 cm; de la Trinité : 53,1 cm, moyenne historique : 54,0 cm) (figure 14). En ce qui concerne le poids moyen de 4,23 kg des dibermarins en 2021 dans la rivière Saint-Jean, il est légèrement inférieur à la moyenne historique, tandis que la longueur à la fourche moyenne de 77,4 cm, est supérieure à la moyenne historique. Dans la rivière de la Trinité, la longueur à la fourche moyenne des dibermarins de 73,1 cm est légèrement supérieure à la moyenne historique de 72,1 cm. Le poids des redibermarins n'est pas mesuré dans la rivière de la Trinité ou, s'il est, ce n'est que sur un faible nombre d'individus.

Historiquement, aucune tendance significative n'est observée pour la longueur à la fourche chez les madeleineaux dans les deux rivières témoins (Saint-Jean : $r^2 = 0,004$, $p = 0,71$; de la Trinité : $r^2 = 0,004$, $p = 0,71$). Le poids des madeleineaux est également resté stable dans le temps dans les rivières Saint-Jean ($r^2 = 0,09$, $p = 0,09$) et de la Trinité ($r^2 = 0,01$, $p = 0,49$). Néanmoins, on observe une augmentation significative du poids et de la longueur à la fourche des madeleineaux avant le début des années 2000 sur les deux rivières, ainsi qu'une diminution importante du poids et de la longueur à la fourche au cours des années suivantes. Les variations de poids étant moins fortes que celles des longueurs sur la rivière Saint-Jean font en sorte que le facteur de condition (K) des madeleineaux a diminué avec le temps sur cette rivière ($r^2 = 0,40$, $p = 0,0001$), mais est resté stable dans la rivière de la Trinité ($r^2 = 0,02$, $p = 0,38$). La longueur à la fourche chez les dibermarins des deux rivières augmente avec le temps (Saint-Jean : $r^2 = 0,18$, $p = 0,02$; de la Trinité : $r^2 = 0,11$, $p = 0,04$), mais s'est stabilisée depuis les années 2000 sur la rivière Saint-Jean et tend à diminuer sur la rivière de la Trinité.

En ce qui concerne le rapport des sexes chez les madeleineaux en 2021, 1,3 % sont des femelles dans la rivière Saint-Jean, alors qu'on dénombre 4,7 % de femelles dans la rivière de la Trinité, les moyennes historiques respectives étant de 1,5 % et de 8,8 % (tableaux XIII et XIV). Au fil du temps, la proportion de femelles chez les madeleineaux est stable dans les deux rivières (Saint-Jean : $r^2 = 0,001$, $p = 0,85$; de la Trinité : $r^2 = 0,04$, $p = 0,22$). Les proportions moyennes historiques de femelles chez les dibermarins

dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité sont de 68,6 % et de 91,5 %, respectivement, et augmentent significativement dans les deux rivières avec le temps (Saint-Jean : $r^2 = 0,30$, $p = 0,005$; de la Trinité : $r^2 = 0,47$, $p = 0,0003$). Notons toutefois que la série temporelle de la rivière de la Trinité se termine en 2003.

Pour ce qui est de l'échantillonnage d'autres espèces en 2021 sur la rivière de la Trinité, c'est un total de 507 ombles de fontaine anadromes qui ont été échantillonnés, soit à la pêche sportive ou lors de mortalité, leur taille variant de 19,8 cm à 54,5 cm, pour une longueur totale moyenne de 33,2 cm. Leur poids moyen est de 0,43 kg, avec une variation de 0,06 kg à 2,34 kg, alors que la proportion de femelles observée chez les ombles de fontaine anadromes atteint 51,8 %. Exceptionnellement, un spécimen d'omble chevalier de 26,2 cm a été capturé à la pêche sportive.

Nombre d'œufs déposés

L'évaluation du nombre d'œufs déposés en rivière se base sur l'évaluation du nombre de géniteurs et de leurs caractéristiques de poids et de fécondité (Caron, 1990; Leclerc, 2015). Les caractéristiques des madeleineaux et des rédibermarins sont obtenues à partir des observations faites sur les poissons capturés sportivement, lors des pêches alimentaires, rituelles et sociales, sur les remises à l'eau, sur les poissons échantillonnés dans la passe migratoire ou trouvés morts. Les caractéristiques moyennes des saumons sont utilisées dans le calcul, plutôt que les valeurs annuelles, puisque le faible nombre de saumons échantillonnés certaines années entraînerait des biais importants. Le poids moyen et la proportion de femelles utilisés chez les madeleineaux et les rédibermarins sont une moyenne pondérée depuis 1992, année à partir de laquelle des changements ont été notés dans les caractéristiques des saumons. Le calcul du nombre d'œufs déposés tient compte du nombre de géniteurs, de la proportion de femelles, du poids moyen et de la valeur standard d'œufs par kilogramme, à la fois pour les madeleineaux et les rédibermarins. Depuis 2012, les valeurs standards de fécondité relative ont été révisées à 2 025 œufs/kg pour les madeleineaux et à 1 745 œufs/kg pour les rédibermarins (Leclerc, 2015).

Selon ces calculs, les géniteurs de la rivière Saint-Jean, au nombre de 280 madeleineaux et de 771 rédibermarins (5 et 543 femelles, respectivement), ont déposé 4,49 millions d'œufs durant le frai, ce qui est largement supérieur au seuil de conservation optimal et positionne la rivière dans la zone saine de gestion (tableau VI). Dans la rivière de la Trinité, les 689 madeleineaux et les 94 rédibermarins (82 et 86 femelles, respectivement) ont déposé 1,00 million d'œufs, soit 60 % du seuil de conservation optimal (tableau VII). Néanmoins, la déposition d'œufs atteint 164 % du seuil de conservation démographique. Au fil du temps, la déposition d'œufs dans la rivière Saint-Jean est restée stable, mais elle est à la baisse dans la rivière de la Trinité (Saint-Jean : $r^2 = 0,0004$, $p = 0,90$; de la Trinité : $r^2 = 0,29$, $p = 0,0002$).

Taux de survie en rivière et taux de retour de la mer

Survie en rivière, de l'œuf au smolt

Le taux de survie en rivière, de l'œuf au smolt, a diminué avec le temps dans la rivière Saint-Jean ($r^2 = 0,51$, $p < 0,0001$), mais il ne démontre plus de diminution significative dans la rivière de la Trinité ($r^2 = 0,06$, $p = 0,16$), en raison des bons taux de survie des deux dernières cohortes (figure 15). Dans la rivière Saint-Jean, le taux de survie moyen observé est de 2,22 % (de 0,77 % à 4,85 %), alors que le

taux de survie en rivière de la cohorte de 2015 est de 1,13 % (tableau XV et figure 15). Dans la rivière de la Trinité, le taux de survie, de l'œuf au smolt, de la cohorte de 2015 est de 3,01 %, ce qui représente un bon taux de survie comparativement au taux historique moyen de 2,26 % (de 1,20 % à 4,82 %; tableau XVI et figure 15).

À plus courte échelle temporelle, soit depuis 2000, les tendances de survie en rivière demeurent semblables aux tendances historiques (Saint-Jean : $r^2 = 0,34$, $p = 0,03$; Trinité : $r^2 = 0,004$, $p = 0,82$).

Taux de retour de la mer, du smolt à l'adulte

Depuis les années 1980, le taux de retour de la mer a fluctué dans le temps, mais une tendance à l'augmentation est observée dans la rivière Saint-Jean ($r^2 = 0,17$, $p = 0,03$), alors qu'une diminution significative a été observée dans la rivière de la Trinité ($r^2 = 0,34$, $p = 0,0002$). Lorsque les madeleineaux et les rédibermarins sont analysés séparément, le taux de retour, du smolt à l'adulte, montre dans le temps une augmentation chez les madeleineaux de la rivière Saint-Jean ($r^2 = 0,30$, $p = 0,002$) et une diminution dans la rivière de la Trinité ($r^2 = 0,15$, $p = 0,02$). Chez les dibermarins, le taux de retour augmente au fil du temps pour la population de la rivière Saint-Jean ($r^2 = 0,19$, $p = 0,02$), alors qu'il diminue significativement dans la rivière de la Trinité ($r^2 = 0,50$, $p < 0,0001$; figure 16). Le taux de retour de la dernière cohorte disponible de smolts partis en migration de la rivière Saint-Jean, soit celle de 2018, a été de 2,53 % (madeleineaux : 0,50 %; dibermarins : 2,04 %; tableau XVII), ce qui est supérieur à la moyenne historique observée à 1,43 %. Dans la rivière de la Trinité, le taux de retour, du smolt à l'adulte, de la cohorte de 2019 est de 1,09 % (madeleineaux : 0,80 %; dibermarins : 0,29 %), ce qui est inférieur à la moyenne historique de 2,07 % (tableau XVIII).

La tendance des taux de retour depuis 2000 est demeurée stable dans les deux rivières (Saint-Jean : $r^2 = 0,14$, $p = 0,12$; De la Trinité : $r^2 = 0,0002$, $p = 0,95$).

Discussion

Le suivi des deux populations témoins de saumon atlantique dans la rivière Saint-Jean, en Gaspésie, et dans la rivière de la Trinité, sur la Côte-Nord, permet d'observer dans le temps des populations modèles faisant face aux changements environnementaux dans des régions naturelles où les influences humaines sont limitées. De façon générale, une diminution de l'abondance de smolts ainsi que d'adultes (madeleineaux et rédibermarins) est observée depuis les années 1980 dans les deux rivières, à l'exception des madeleineaux dans la rivière Saint-Jean, dont le nombre est demeuré stable. La tendance à la baisse de plusieurs indicateurs populationnels confirme donc que le saumon atlantique requiert encore aujourd'hui des efforts de conservation. Heureusement, une importante diminution des récoltes par la pêche et une stabilisation relative des taux de survie en mer au cours des dernières décennies ont permis aux deux rivières témoins de se maintenir au-delà du seuil de conservation démographique et de freiner, depuis 2000, le déclin de l'abondance des adultes.

Le taux de survie en rivière, de l'œuf au smolt, diminue avec le temps dans la rivière Saint-Jean, alors qu'il n'y a pas de tendance significative pour la rivière de la Trinité. En ce qui concerne la phase de vie en mer, les taux de retour, du smolt à l'adulte, sont demeurés stables sur les deux rivières depuis 2000. Sur une plus longue échelle temporelle, la rivière de la Trinité présente une diminution significative des taux de retour alors que la rivière Saint-Jean affiche plutôt une augmentation importante. Cette différence dans les tendances historiques de taux de retour de la mer entre les deux rivières témoins indique que les saumons de la rivière de la Trinité pourraient avoir été davantage influencés négativement par les changements de conditions biotiques et abiotiques en mer que ceux de la rivière Saint-Jean. L'habitat marin des post-smolts pourrait être différent pour ces deux populations et comporter des caractéristiques et des changements environnementaux distincts (Lefèvre et coll., 2012; Bourret et coll., 2014). Il demeure également possible que la diminution du taux de survie en mer soit en réalité causée par des phénomènes qui se produisent en eaux douces. Des travaux sont notamment en cours afin de vérifier si le faible pH des cours d'eau de la région de la Côte-Nord peut nuire aux processus physiologiques de smoltification et ainsi compromettre la survie des smolts lors de leur arrivée en eau salée (Sanders et coll., 1983; Roy, 1997).

L'ensemble des données récoltées grâce au suivi des deux rivières témoins pour le saumon atlantique au Québec indique que chaque rivière possède sa propre dynamique de population et que chaque population peut être touchée différemment par les changements environnementaux. Tout de même, ces rivières présentent des populations modèles pour leurs régions respectives, régions ayant des caractéristiques génétiques distinctes tant sur le plan du génome des individus en général que sur celui de certains gènes du système immunitaire impliqués dans l'adaptation locale (Dionne et coll., 2007; Dionne et coll., 2008; Bourret et coll., 2013). Ces suivis permettent donc d'obtenir des données historiques fiables sur des populations modèles appartenant à deux régions géographiques et génétiques distinctes pouvant être comparées aux autres populations subissant les effets d'activités humaines importantes dans ces mêmes régions.

Conclusion

Au Québec, certaines populations de saumon atlantique se portent suffisamment bien pour offrir une pêche récréative de grande qualité et d'autres sont dans un état préoccupant. Dans ce contexte, une gestion efficace des stocks doit être appuyée par une bonne connaissance de l'évolution des caractéristiques biologiques des populations, d'où l'importance du suivi effectué dans les rivières témoins.

En plus d'être nécessaires à l'accomplissement de la mission du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les données historiques tirées de ces rivières ont été utilisées à diverses fins au cours des dernières années. Les retombées indirectes de ces suivis incluent l'établissement des points de référence biologiques associés à chacune des rivières à saumon du Québec et utilisés pour la gestion de la pêche (Dionne et coll., 2015). Ces données ont également permis la mise en œuvre des premières étapes de développement d'analyses de viabilité de population (AVP) permettant de prédire l'abondance et la condition des populations à plus long terme ainsi que leur probabilité de persistance (Palstra et Dionne, 2011). De plus, au cours des dernières années, de nombreux projets de recherche ont été greffés au suivi des rivières témoins ou ont utilisé les données associées à celui-ci. Par exemple ont été étudiés la variation de la niche trophique des saumons juvéniles par l'analyse des isotopes stables (Dixon et coll., 2012), l'influence des changements climatiques sur la migration et la croissance des saumons juvéniles (Otero et coll., 2014), la composante génétique associée à la survie en mer (Bourret et coll., 2014), la biogéographie du microbiome chez le saumon atlantique (Llewellyn et coll., 2015), la détermination des composantes héréditaires de la durée de migration en mer (Kushes et coll., 2017) et la variation spatio-temporelle de la proportion des saumons multifrayers (Bordeleau et coll., 2020). Les données des rivières témoins ont également été mises à profit dans le cadre d'une étude publiée par Pardo et coll. en 2021 laquelle démontre que les taux de survie en mer de diverses populations au Canada évoluent de façon différente. Finalement, le suivi de nature comparable réalisé de 2010 à 2019 sur la rivière du Vieux-Fort, qui se trouve dans la région de la Basse-Côte-Nord et qui héberge une population de saumons aux caractéristiques particulières, a permis de mettre davantage en valeur le suivi des rivières Saint-Jean et de la Trinité en offrant de nouvelles possibilités d'analyse. La popularité des données tirées de ces suivis à des fins de recherche ou de gestion montre que les travaux réalisés sur les rivières Saint-Jean et de la Trinité sont d'une immense utilité pour repousser les limites des connaissances scientifiques sur l'espèce.

Glossaire

<i>Alevin</i>	Juvenile dans sa première année de vie et qui n'a pas encore développé les marques caractéristiques des tacons sur les flancs.
<i>Tacon</i>	Saumon qui est toujours demeuré en rivière depuis sa naissance et qui présente les marques caractéristiques des tacons. Lorsqu'on veut préciser l'âge, on utilise tacon 0+, tacon 1+, tacon 2+, etc., pour désigner des poissons à leur première, deuxième, troisième année de vie. Il s'agit habituellement de juvéniles (mais voir <i>Tacon précoce</i>).
<i>Tacon précoce</i>	Poisson qui participe au frai alors qu'il est encore au stade de tacon (habituellement un mâle).
<i>Smolt ou saumoneau</i>	Saumon qui amorce sa première migration vers la mer et qui a perdu, ou qui est en voie de perdre, les marques caractéristiques des tacons. Le terme « smolt » désigne aussi d'autres salmonidés anadromes qui entreprennent leur première migration en mer. Il s'agit habituellement de juvéniles (mais voir <i>Smolt post-précoce</i>).
<i>Smolt post-précoce</i>	Smolt qui a frayé comme tacon précoce.
<i>Madeleineau</i>	Saumon qui revient en rivière pour frayer la première fois, après avoir passé un seul hiver en mer.
<i>Dibermarin</i>	Saumon qui revient en rivière pour frayer la première fois, après avoir passé deux hivers consécutifs en mer.
<i>Tribermarin</i>	Saumon qui revient en rivière pour frayer la première fois, après avoir passé trois hivers consécutifs en mer.
<i>Saumon à frai antérieur</i>	Saumon qui a déjà frayé au cours des années antérieures.
<i>Rédibermarin ou grand saumon</i>	Saumon qui a passé plus d'un hiver en mer. Ce terme englobe tous les grands saumons et exclut donc les madeleineaux.
<i>Reproducteur ou géniteur</i>	Saumon adulte revenu à la rivière et présent au moment du frai.
<i>Saumon noir</i>	Saumon adulte en dévalaison printanière.
<i>Unité de production</i>	Unité de mesure pour quantifier l'habitat des juvéniles.

Liste des références

- BEVERTON, R. J. H., et S. J. HOLT (1957). *On the dynamics of exploited fish populations*, Londres, Chapman & Hall, Fish and Fisheries Series, vol. 11.
- BICKHAM, J. W., S. SANDHU, P. D. N. HEBERT, L. CHIKHI et R. ATHWAL (2000). "Effects of contaminants on genetic diversity in natural populations: implications for biomonitoring and ecotoxicology", *Mutation Research*, vol. 463, p. 33-51.
- BORDELEAU, X., S. A. PARDO, G. CHAPUT, J. APRIL, B. DEMPSON, M. ROBERTSON et G. T. CROSSIN (2020). "Spatio-temporal trends in the importance of iteroparity across Atlantic salmon populations of the northwest Atlantic", *ICES Journal of Marine Science*, vol. 77, n° 1, p. 326-344.
- BOURRET, V., M. DIONNE et L. BERNATCHEZ (2014). "Detecting genotypic changes associated with selective mortality at sea in Atlantic salmon: polygenic multilocus analysis surpasses genome scan", *Molecular Ecology*, vol. 23, p. 4444-4457.
- BOURRET, V., M. DIONNE, M. P. KENT, L. SIGBJORN et L. BERNATCHEZ (2013). "Landscape genomics in Atlantic salmon (*Salmo salar*): searching for gene-environment interactions driving local adaptation", *Evolution*, vol. 67, n° 12, p. 3469-3487.
- CARON, F. (1990). « Calculs relatifs à la détermination du nombre de reproducteurs requis », dans N. Samson et J.-P. Le Bel (dir.), *Compte rendu de l'atelier sur le nombre de reproducteurs requis dans les rivières à saumon, Île-aux-Coudres, février 1988*, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Direction de la gestion des espèces et des habitats, p. 213-218.
- CARON, F., P.-M. FONTAINE et S.-É. PICARD (1999). *Seuil de conservation et cible de gestion pour les rivières à saumon (Salmo salar) du Québec*, Québec, Société de la faune et des parcs du Québec, Direction de la faune et des habitats, 48 p.
- CHAPMAN, D. G. (1951). *Some properties of the hypergeometric distribution with applications to zoological sample censuses*, Berkeley, University of California Press (University of California publications in statistics, vol. 1).
- CONOVER, D. O., S. B. MUNCH et S. A. ARNOTT (2009). "Reversal of evolutionary downsizing caused by selective harvest of large fish", *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, vol. 276, n° 1664, p. 2015-2020.
- CONOVER, D. O., et S. B. MUNCH (2002). "Sustaining fisheries yields over evolutionary time scales", *Science*, vol. 297, n° 5578, p. 94-96.
- COMITÉ SUR LA SITUATION DES ESPÈCES EN PÉRIL DU CANADA (COSEPAC) (2011). [www.cosewic.gc.ca].
- DFO (2008). *NuSEDS, V. 2.0, Regional adult salmon escapement database 1950-2005*, Colombie-Britannique, Pêches et Océans Canada, La station biologique du Pacifique.

- DIONNE, M., G. DAUPHIN, G. CHAPUT et E. PRÉVOST (2015). *Actualisation du modèle stock-recrutement pour la conservation et la gestion des populations de saumon atlantique du Québec*, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Direction générale de la gestion de la faune et des habitats, Direction de l'expertise sur la faune aquatique, 66 p.
- DIONNE, M., K. M. MILLER, J. J. DODSON, F. CARON et L. BERNATCHEZ (2007). "Clinal variation in MHC diversity with temperature: evidence for the role of host-pathogen interaction on local adaptation in Atlantic salmon", *Evolution*, vol. 61, p. 2154-2164.
- DIONNE, M., F. CARON, J. J. DODSON et L. BERNATCHEZ (2008). "Landscape genetics and hierarchical genetic structure in Atlantic salmon: the interaction of gene flow and local adaptation", *Molecular Ecology*, vol. 17, p. 2382-2396.
- DIXON, H. J., M. POWER, J. B. DEMPSON, T. F. SHEEHAN et G. CHAPUT (2012). "Characterizing the trophic position shift in Atlantic salmon (*Salmo salar*) from freshwater to marine life-cycle phases using stable isotopes", *ICES Journal of Marine Science*, doi:10.1093/icesjms/fss122.
- GIBSON, A. J. F., H. D. BOWLBY, J. R. BRYAN et P. G. AMIRO (2008). *Population viability analyses of Inner Bay of Fundy Atlantic Salmon with and without live gene banking*, Ottawa, Canadian Science Advisory Secretariat, Pêches et Océans Canada, Document de recherche n° 2008/057.
- GRANT, S. C. H., S. M. KALYN, J. E. MAHONEY et J. A. TADEY (2007). *Coho (Oncorhynchus kisutch) and Chum (O. keta) salmon visual enumeration surveys in twenty-six lower Fraser area streams: 1999-2005*, Ottawa, Pêches et Océans Canada, VI + 154 p. (Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 2727).
- GURNEY, W. S. C., P. J. BACON, G. TYLDESLEY et A. F. YOUNGSON (2008). "Process-based modelling of decadal trends in growth, survival, and smolting of wild salmon (*Salmo salar*) parr in a Scottish upland stream", *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, vol. 65, p. 2606-2622.
- HOFFMANN, A. A., et Y. WILLI (2008). "Detecting genetic responses to environmental change", *Nature Reviews in Genetics*, vol. 9, p. 421-432.
- ICES (2021). Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS). ICES Scientific Reports. 3:29, 407 p. [<https://doi.org/10.17895/ices.pub.7923>].
- KUSHES H., G. COTE, C. HERNANDEZ, E. NORMANDEAU, D. BOIVIN-DELISLE et L. BERNATCHEZ (2017). "Characterization of natural variation in North American Atlantic Salmon populations (Salmonidae: *Salmo salar*) at a locus with a major effect on sea age", *Ecology and Evolution*, vol. 7, n° 15, p. 5797-5807.
- LECLERC, V. (2015). *Révision des valeurs standards de fécondité relative utilisées au Québec pour le saumon atlantique (Salmo salar)*, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la faune aquatique, 10 p.

- LEFEVRE, M. A., M. J. W. STOKESBURY, F. G. WHORISKEY et M. J. DADSWELL (2012). "Atlantic salmon post-smolt migration routes in the Gulf of St. Lawrence", *ICES Journal of Marine Science*, vol. 69, n° 6, p. 981-990.
- LEGAULT, C. M. (2005). "Population viability analysis of Atlantic salmon in Maine, USA", *Transactions of the American Fisheries Society*, vol. 134, p. 549-562.
- LLEWELLYN, M. S., P. MCGINNITY, M. DIONNE, J. LETOURNEAU, F. THONIER, G. R. CARVALHO, S. CREER et N. DEROME (2015). "The biogeography of the Atlantic salmon (*Salmo salar*) gut microbiome", *International Society for Microbial Ecology*, vol. 10, p.1280-1284.
- MILLER, K. P., et E. R. VINCENT (2008). "Rapid natural selection for resistance to an introduced parasite of rainbow trout", *Evolutionary Applications*, vol. 1, p. 336-341.
- MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2021). *Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 2020*, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Secteur de la faune, 302 p.
- OTERO, J., J. H. L'ABEE-LUND, T. CASTRO-SANTOS, K. LEONARDSSON, G. O. STORVIK, B. JONSSON, B. DEMPSON, I. C. RUSSELL, A. J. JENSEN, J.-L. BAGLINIERE, M. DIONNE, J. D. ARMSTRONG, A. ROMAKKANIEMI, B. H. LETCHER, J. F. KOCIK, J. ERKINARO, R. POOLE, G. ROGAN, H. LUNDQVIST, J. C. MACLEAN, E. JOKIKOKKO, J. V. ARNEKLEIV, R. J. KENNEDY, E. NIEMELA, P. CABALLERO, P. A. MUSIC, T. ANTONSSON, S. GUDJONSSON, A. E. VESELOV, A. LAMBERG, S. GROOM, B. H. TAYLOR, M. TABERNER, M. DILLANE, F. ARNASON, G. HORTON, N. A. HVIDSTEN, I. R. JONSSON, N. JONSSON, S. MCKELVEY, T. F. NÆSJE, Ø. SKAALA, G. W. SMITH, H. SÆGROV, N. C. STENSETH et L. A. VØLLESTAD (2014). "Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (*Salmo salar*)", *Global Change Biology*, vol. 20, p. 61-75.
- PALSTRA, F., et M. DIONNE (2011). *Population viability analysis of Atlantic salmon populations (Salmo salar) in Québec*, Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats, Service de la faune aquatique, 95 p.
- PARDO, S. A., G. H. BOLSTAD, J. B. DEMPSON, J. APRIL, R. A. JONES, D. RAAB et J. A. HUTCHINGS. (2021). "Trends in marine survival of Atlantic salmon populations in eastern Canada", *ICES Journal of Marine Science*, 78(7), 2460-2473.
- PARRISH, D. L., R. J. BEHNKE, S. R. GEPHARD, S. D. McCORMICK et G. H. REEVES (1998). "Why aren't there more Atlantic salmon (*Salmo salar*)?", *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, vol. 55, p. 281-287.
- RICKER, W. E. (1954). "Stock and recruitment", *Journal of the Fisheries Research Board of Canada*, vol. 11, p. 559-623.
- RICKER, W. E. (1980). « Calcul et interprétation des statistiques biologiques des populations de poissons », *Bulletin of Fisheries Research Board of Canada*, n° 191F, 409 p.

- ROY, R. (1997). La toxicité de mélanges de métaux (AL, ZN), en conditions acides vis-à-vis du saumon de l'Atlantique *Salmo Salar*. 1997. Thèse de doctorat. Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique.
- SAUNDERS. L., E. B. HENDERSON, P. R. HARMON *et al.* "Effects of low environmental pH on smolting of Atlantic salmon (*Salmo salar*)", (1983) *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 1983, vol. 40, n° 8, p. 1203-1211.
- SCHWARTZ, M. K., G. LUIKART et R. S. WAPLES (2006). "Genetic monitoring as a promising tool for conservation and management", *Trends in Ecology and Evolution*, vol. 22, p. 25-33.
- SHRIMPTON, J. M., et D. D. HEATH (2003). "Census vs. effective population size in chinook salmon: large- and small-scale environmental perturbation effects", *Molecular Ecology*, vol. 12, p. 2571-2583.
- THOMPSON, D. A. W. (1942). *On growth and form*, Cambridge, Cambridge University Press.
- WWF (2001). *Report on the status of Atlantic salmon: a river by river assessment*, Washington DC, Marine conservation program [http://www.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?3729/The-Status-of-Wild-Atlantic-Salmon-A-River-by-River-Assessment].

Tableaux

Tableau I. Captures de smolts en dévalaison printanière dans la rivière Saint-Jean en 2021

Date	Marqués (M)		Capturés (C)		Recapturés (R)		Marqués %
	Nombre	Cumul.	Nombre	Cumul.	Nombre	Cumul.	
05-13	1	1	1		0		4,5
05-14	93	94	98	98	4	4	4,5
05-15	186	280	195	293	9	13	4,5
05-16	76	356	84	377	5	18	6,0
05-17	155	511	168	545	7	25	4,2
05-18	287	798	304	849	10	35	3,3
05-19	253	1 051	301	1 150	43	78	14,3
05-20	444	1 495	467	1 617	19	97	4,1
05-21	497	1 992	535	2 152	27	124	5,0
05-22	389	2 381	426	2 578	27	151	6,3
05-23	883	3 264	940	3 518	48	199	5,1
05-24	731	3 995	1057	4 575	318	517	30,1
05-25	89	4 084	756	5 331	118	635	15,6
05-26	113	4 197	126	5 457	10	645	7,9
05-27	295	4 492	310	5 767	12	657	3,9
05-28	380	4 872	408	6 175	23	680	5,6
05-29	249	5 121	256	6 431	4	684	1,6
05-30	277	5 398	383	6 814	105	789	27,4
05-31	190	5 588	207	7 021	15	804	7,2
06-01	161	5 749	193	7 214	30	834	15,5
06-02	386	6 135	409	7 623	19	853	4,6
06-03	304	6 439	347	7 970	39	892	11,2
06-04	127	6 566	152	8 122	23	915	15,1
06-05	275	6 841	293	8 415	15	930	5,1
06-06	86	6 927	144	8 559	56	986	38,9
06-07	37	6 964	50	8 609	12	998	24,0
06-08	28	6 992	35	8 644	7	1 005	20,0
06-09	14	7 006	17	8 661	2	1 007	11,8
06-10	11	7 017	15	8 676	2	1 009	13,3
06-11	10	7 027	13	8 689	0	1 009	0,0
06-12	1	7 028	3	8 692	0	1 009	0,0
06-13	6	7 034	9	8 701	0	1 009	0,0
06-14	4	7 038	7	8 708	1	1 010	14,3
06-15	0	7 038	1	8 709	0	1 010	0,0
06-16	0	7 038	1	8 710	0	1 010	0,0
06-17			1	8 711	0	1 010	0,0
Total		7 038		8 712		1 010	11,6

Évaluation :	M	C	R	N min.	N	N max.
	7 038	8 712	1 010	57 030	60 654	64 507

Morts et échantillons, zone de capture : 1 Smolts produits Smolts partis en mer

Morts et échantillons, zone de recapture : 149 60 655 60 505

Remarques : Les données en italique ne font pas partie de l'évaluation, car les smolts prennent en moyenne une journée pour atteindre la zone de recapture.

Trappe partiellement opérationnelle

Estimation des smolts ayant dévalés les jours précédents la mise en eau des trappes selon la température de l'eau et en utilisant le taux de recapture moyen des 3 premiers jours.

Estimation des smolts ayant pu être capturés dans la trappe inopérante le 25 mai selon le taux d'efficacité moyen de chacune des trappes et le taux de recapture moyen du jour précédent et suivant la période d'interruption.

Tableau II. Captures de smolts en dévalaison printanière dans la rivière de la Trinité en 2021

Date	Zone de capture				Zone de recapture				Marqués %
	Capturés		Marqués (M)		Capturés (C)		Recapturés (R)		
	Nombre	Cumul.	Nombre	Cumul.	Nombre	Cumul.	Nombre	Cumul.	
05-19			14	14	<i>14</i>		<i>0</i>		
05-20			31	45	37	37	3	3	8,1
05-21	41	41	41	86	35	72	4	7	11,4
05-22	119	160	117	203	108	180	5	12	4,6
05-23	386	546	386	589	139	319	8	20	5,8
05-24	361	907	361	950	202	521	38	58	18,8
05-25	221	1 128	221	1 171	<i>58</i>	<i>579</i>	<i>4</i>	<i>62</i>	6,9
05-26	<i>58</i>	<i>1 186</i>	<i>140</i>	<i>1 311</i>	176	755	38	100	21,6
05-27	<i>62</i>	<i>1 248</i>	<i>213</i>	<i>1 524</i>	184	939	33	133	17,9
05-28	188	1 436	188	1 712	110	1 049	16	149	14,5
05-29	136	1 572	135	1 847	143	1 192	19	168	13,3
05-30	245	1 817	245	2 092	342	1 534	46	214	13,5
05-31	506	2 323	505	2 597	584	2 118	76	290	13,0
06-01	205	2 528	205	2 802	157	2 275	39	329	24,8
06-02	742	3 270	742	3 544	615	2 890	94	423	15,3
06-03	1029	4 299	1028	4 572	411	3 301	39	462	9,5
06-04	508	4 807	507	5 079	165	3 466	32	494	19,4
06-05	297	5 104	297	5 376	123	3 589	17	511	13,8
06-06	269	5 373	269	5 645	105	3 694	8	519	7,6
06-07	195	5 568	195	5 840	70	3 764	13	532	18,6
06-08	153	5 721	153	5 993	55	3 819	13	545	23,6
06-09	76	5 797	76	6 069	35	3 854	1	546	2,9
06-10	18	5 815	18	6 087	8	3 862	3	549	37,5
06-11	23	5 838	23	6 110	5	3 867	2	551	40,0
06-12	7	5 845	7	6 117	14	3 881	2	553	14,3
06-13	6	5 851	6	6 123	15	3 896	1	554	6,7
06-14	1	5 852	1	6 124	1	3 897	0	554	0,0
06-15	7	5 859	7	6 131	1	3 898	0	554	0,0
06-16	27	5 886	26	6 157	12	3 910	2	556	16,7
06-17	98	5 984	98	6 255	95	4 005	12	568	12,6
06-18	7	5 991	7	6 262	22	4 027	10	578	45,5
06-19	17	6 008	17	6 279	42	4 069	17	595	40,5
06-20	9	6 017	9	6 288	17	4 086	7	602	41,2
06-21	9	6 026	9	6 297	26	4 112	4	606	15,4
06-22	2	6 028	2	6 299	11	4 123	2	608	18,2
06-23	4	6 032	4	6 303	5	4 128	2	610	40,0
06-24	0	6 032	0	6 303	1	4 129	0	610	0,0
06-25	<i>1</i>		<i>1</i>		2	4 131	0	610	0,0
Total		6 032		6 303		4 131		610	14,8


Évaluation :

M	C	R	N min.	N	N max.
6 303	4 131	610	39 385	42 632	46 146

Morts et échantillons, zone de capture : 47 Smolts produits Smolts partis en mer

Morts et échantillons, zone de recapture : 145 42 679 42 487

Remarques : Les données en italique ne font pas partie de l'évaluation, car les smolts prennent en moyenne 1,5 jour pour atteindre la zone de recapture.

 Trappe partiellement opérationnelle.

 Période d'étiage sévère, les trappes ne tournent presque plus, donc très peu efficace

Tableau III. Caractéristiques des smolts dans la rivière Saint-Jean en 2021

	2 ans			3 ans			4 ans			5 ans			Tous		
	Mâles	Femelles	Tous												
Nombre	1	1	2	28	89	117	12	8	20	2	0	2	43	98	141
Proportion	50 %	50 %	1 %	24 %	76 %	83 %	60 %	40 %	14 %	100 %	0 %	1 %	30 %	70 %	100 %
Âge à la smoltification													3,35	3,07	3,16
Poids (g)															
Moyenne	9,5	13,0	11,2	13,8	14,4	14,3	19,7	16,6	18,5	18,7		18,7	15,6	14,6	14,9
Minimum	9,5	13,0	9,5	8,0	7,4	7,4	10,3	11,7	10,3	14,2		14,2	8,0	7,4	7,4
Maximum	9,5	13,0	13,0	21,5	29,7	29,7	32,3	20,8	32,3	23,2		23,2	32,3	29,7	32,3
Écart-type			2,5	3,7	4,3	4,2	7,1	3,3	6,0	6,4		6,4	5,6	4,3	4,7
Longueur totale (mm)															
Moyenne	108	122	115	126	129	128	141	136	139	141		141	131	129	130
Minimum	108	122	108	107	103	103	117	123	117	131		131	107	103	103
Maximum	108	122	122	144	160	160	171	146	171	151		151	171	160	171
Écart-type			9,9	10,5	11,4	11,2	15,9	8,7	13,4	14,1		14,1	14,2	11,3	12,2
Longueur à la fourche (mm)															
Moyenne	100	114	107	117	119	118	131	126	129	131		131	121	119	120
Minimum	100	114	100	98	95	95	108	114	108	121		121	98	95	95
Maximum	100	114	114	133	151	151	159	136	159	141		141	159	151	159
Écart-type			9,9	10,0	10,9	10,7	15,0	8,5	12,7	14,1		14,1	13,4	10,8	11,7
Facteur de condition de Fulton															
Moyenne	0,95	0,88	0,91	0,84	0,84	0,84	0,85	0,82	0,84	0,81		0,81	0,84	0,84	0,84
Minimum	0,95	0,88	0,88	0,73	0,74	0,73	0,76	0,77	0,76	0,80		0,80	0,73	0,74	0,73
Maximum	0,95	0,88	0,95	0,93	1,08	1,08	0,90	0,87	0,90	0,83		0,83	0,95	1,08	1,08
Écart-type			0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,02		0,02	0,05	0,05	0,05

Tableau IV. Caractéristiques des smolts dans la rivière de la Trinité en 2021

	2 ans			3 ans			4 ans			5 ans			Tous		
	Mâles	Femelles	Tous	Mâles	Femelles	Tous	Mâles	Femelles	Tous	Mâle	Femelles	Tous	Mâles	Femelles	Tous
Nombre	1	4	5	42	89	131	7	6	13	0	1	1	50	100	150
Proportion	20 %	80 %	3 %	32 %	68 %	87 %	54 %	46 %	9 %	0 %	1 %	1 %	33 %	67 %	100 %
Âge à la smoltification													3,12	3,04	3,07
Poids (g)															
Moyenne	17,1	14,6	15,1	18,8	18,5	18,6	22,7	22,2	22,5		29,5	29,5	19,4	18,7	18,9
Minimum	17,1	13,7	13,7	11,2	9,8	9,8	18,3	16,9	16,9		29,5	29,5	11,2	9,8	9,8
Maximum	17,1	16,6	17,1	42,3	36,9	42,3	39,0	27,3	39,0		29,5	29,5	42,3	36,9	42,3
Écart-type		1,4	1,6	5,3	4,7	4,9	7,4	4,8	6,1				5,6	4,9	5,1
Longueur totale (mm)															
Moyenne	131	128	128	137	136	137	146	146	146		161	161	138	137	137
Minimum	131	124	124	120	114	114	133	133	133		161	161	120	114	114
Maximum	131	133	133	173	175	175	176	160	176		161	161	176	175	176
Écart-type		3,9	3,6	10,1	10,7	10,5	14,8	11,1	12,7				11,2	11,1	11,1
Longueur à la fourche (mm)															
Moyenne	120	117	118	125	125	125	134	134	134		149	149	126	126	126
Minimum	120	114	114	110	104	104	121	121	121		149	149	110	104	104
Maximum	120	122	122	159	160	160	161	148	161		149	149	161	160	161
Écart-type		3,5	3,3	9,7	10,0	9,9	13,4	10,7	11,7				10,6	10,4	10,4
Facteur de condition de Fulton															
Moyenne	0,99	0,91	0,93	0,94	0,92	0,93	0,92	0,91	0,92		0,89	0,89	0,94	0,92	0,93
Minimum	0,99	0,89	0,89	0,83	0,78	0,78	0,84	0,84	0,84		0,89	0,89	0,83	0,78	0,78
Maximum	0,99	0,92	0,99	1,05	1,06	1,06	1,03	0,97	1,03		0,89	0,89	1,05	1,06	1,06
Écart-type		0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06				0,06	0,06	0,06

Tableau V. Estimation de la dévalaison et caractéristiques des smolts de la rivière Saint-Jean de 1989 à 2021 et de la rivière de la Trinité de 1984 à 2021

Année	Rivière Saint-Jean										Rivière de la Trinité									
	Estimation dévalaison (n)	Échantillon (n)	LT \bar{x} (mm)	K \bar{x}	Âge \bar{x}	Âge (an) en %				Femelles %	Estimation dévalaison (n)	Échantillon (n)	LT \bar{x} (mm)	K \bar{x}	Âge \bar{x}	Âge (an) en %				Femelles %
1984											68 208	281		0,73	2,89	13	85	1	0	63
1985											66 069	86	131	0,99	2,90	17	76	7	0	53
1986											96 545	207	124	1,08	3,01	8	82	10	0	59
1987											77 617	221	129	1,05	3,10	5	79	16	0	55
1988											51 879	230	131	0,97	2,73	37	53	10	0	56
1989	92 665	269	126	0,91	3,56	1	43	54	1	66	80 057	313	132	0,97	2,79	28	66	6	0	56
1990	97 992	224	125	0,89	3,38	2	60	34	3	66	50 328	193	127	0,83	3,07	8	78	13	1	63
1991	113 927	177	125	0,88	3,66	2	35	57	6	61	40 863	163	132	0,92	3,08	8	76	16	0	61
1992	154 980	189	128	0,90	3,49	1	53	44	3	68	50 869	205	136	0,92	3,03	9	78	13	0	55
1993	142 972	208	129	0,86	3,61	1	37	61	0	65	86 226	265	138	0,94	3,03	6	85	8	1	68
1994	74 285	324	121	0,91	3,71	2	29	66	3	63	55 913	144	132	0,96	3,03	9	79	11	1	58
1995	60 227	228	124	0,90	3,71	2	30	64	5	61	71 899	220	134	0,95	3,01	15	69	16	0	55
1996	105 013	113	129	0,87	3,53	4	43	47	5	63	61 092	193	130	0,95	3,05	4	88	9	0	55
1997		238	122	0,92	3,37	5	56	37	3	56	31 892	213	133	0,94	3,09	7	77	16	0	60
1998	95 863	182	122	0,93	2,97	18	67	15	0	62	28 962	171	143	0,97	3,08	10	72	18	0	57
1999	114 348	224	128	0,90	3,37	4	57	37	2	67	56 557	137	131	0,94	2,87	21	71	8	0	59
2000	51 065	190	131	0,88	3,58	3	45	42	9	64	39 744	110	133	0,94	2,88	23	66	11	0	56
2001	109 860	130	128	0,85	3,25	12	52	35	2	63	70 318	150	134	0,96	2,93	11	86	3	0	57
2002	71 839	164	124	0,86	3,16	12	62	25	1	72	44 264	127	135	0,89	2,96	10	83	6	0	70
2003	60 259	238	127	0,84	3,23	3	73	24	1	66	53 030	249	135	0,89	3,02	9	80	11	0	60
2004	54 821	229	124	0,84	3,21	7	66	28	0	65	27 302	246	132	0,88	3,06	7	80	13	0	59
2005	96 002	150	123	0,86	3,39	2	59	37	2	65	34 867	235	136	0,89	3,01	7	86	7	0	70
2006	102 939	200	126	0,86	3,45	3	54	39	5	67		185	130	0,88	2,88	21	71	8	0	61
2007	135 360	210	127	0,85	3,49	1	57	34	8	64	42 923	202	129	0,91	3,01	6	87	6	0	63
2008	45 978	198	124	0,82	3,33	3	62	34	1	62	35 036	219	128	0,87	3,00	10	82	8	0	61
2009	37 297	200	126	0,84	3,26	6	63	31	1	62	32 680	228	133	0,92	3,03	5	86	8	0	60
2010	48 187	192	130	0,86	3,19	4	74	21	1	65	37 500	205	138	0,87	2,99	11	80	10	0	60
2011	45 214	159	126	0,85	3,27	6	64	29	2	55	44 400	198	128	0,90	2,95	10	84	6	0	56
2012	40 787	200	128	0,87	3,06	19	58	23	1	63	45 108	203	135	0,92	2,85	25	67	8	0	59
2013	36 849	197	129	0,87	3,22	8	65	25	2	61	42 378	200	130	0,89	2,94	16	75	10	0	63
2014	56 456	156	127	0,85	3,47	3	47	48	1	67	30 741	156	135	0,89	2,96	17	71	12	1	53

Tableau V. Estimation de la dévalaison et caractéristiques des smolts de la rivière Saint-Jean de 1989 à 2021 et de la rivière de la Trinité de 1984 à 2021

Année	Rivière Saint-Jean										Rivière de la Trinité									
	Estimation dévalaison (n)	Échantillon (n)	LT \bar{x} (mm)	K \bar{x}	Âge \bar{x}	Âge (an) en %				Femelles %	Estimation dévalaison (n)	Échantillon (n)	LT \bar{x} (mm)	K \bar{x}	Âge \bar{x}	Âge (an) en %				Femelles %
2015											47 566	150	132	0,90	2,89	15	81	4	0	64
2016	58 307	148	124	0,90	3,28	7	61	29	3	77	42 269	149	136	0,93	3,14	5	76	18	1	65
2017	34 261	142	128	0,86	3,42	1	60	35	4	68	27 433	151	136	0,92	3,20	5	73	21	2	68
2018	38 214	153	130	0,83	3,38	1	61	37	1	69	35 519	138	140	0,90	2,79	32	57	11	0	62
2019	36 988	167	123	0,83	3,08	4	85	11	0	60	28 230	124	135	0,92	2,88	12	88	0	0	59
2020	38 110	150	130	0,87	3,30	4	62	34	0	61	38 892	150	137	0,90	2,89	13	85	2	0	58
2021	60 655	141	130	0,84	3,16	1	83	14	1	70	42 679	150	137	0,93	3,07	3	87	9	1	67
Moyenne	74 572		126	0,87	3,37	5	56	37	2	64	49 131		133	0,92	2,98	13	78	10	0	60

Notes : LT = Longueur totale K = Facteur de condition de Fulton [100 000 * poids (g) / longueur à la fourche³ (mm)] (Thompson, 1942)

Tableau VI. Bilan de l'exploitation des saumons dans la rivière Saint-Jean de 1984 à 2021

Année	Pêche sportive							Retraits divers	Retours à la rivière			Reproduction			Déposition d'œufs	
	Mad.	Réd.	Total	Jours- pêche		Succès Graciés	Succès ajusté		Mad.	Réd.	Total	Saumons disponibles			Œufs déposés (million)	Atteinte du seuil (optimal depuis 2016)
				Succès	Graciés							Mad.	Réd.	Total		
1984	25	345	370	819	0,45	0,45	52	113	1 116	1 229	88	719	807	3,42	182 %	
1985	19	322	341	925	0,37	0,37	0	61	795	856	42	473	515	2,25	120 %	
1986	70	240	310	854	0,36	0,36	20	155	819	974	85	559	644	2,66	142 %	
1987	114	267	381	1 186	0,32	0,32	11	563	1 069	1 632	449	791	1 240	3,78	201 %	
1988	150	587	737	1 419	0,52	0,52	27	436	1 937	2 373	280	1 329	1 609	6,33	337 %	
1989	107	504	611	2 135	0,29	0,29	24	262	1 375	1 637	139	863	1 002	4,11	219 %	
1990	220	254	474	1 717	0,28	0,28	9	512	772	1 284	291	510	801	2,44	130 %	
1991	143	507	650	1 504	0,43	0,43	0	437	1 487	1 924	294	980	1 274	4,67	249 %	
1992	303	623	926	2 053	0,45	0,45	3	559	1 478	2 037	255	853	1 108	4,38	233 %	
1993	320	508	828	1 763	0,47	0,47	6	619	1 102	1 721	295	592	887	3,05	162 %	
1994	256	578	834	2 710	0,31	0,31	9	494	1 258	1 752	232	677	909	3,48	185 %	
1995	80	420	500	1 998	0,25	0,25	27	245	1 138	1 383	163	693	856	3,56	189 %	
1996	152	364	516	1 494	0,35	0,35	20	341	798	1 139	185	418	603	2,15	114 %	
1997	129	204	333	1 394	0,24	122	0,33	14	304	598	902	171	384	555	1,98	105 %
1998	171	0	171	1 245	0,14	291	0,37	1	483	431	914	312	430	742	2,22	118 %
1999	92	0	92	1 229	0,07	279	0,30	1	324	736	1 060	232	735	967	3,78	201 %
2000	87	3	90	1 298	0,07	320	0,32	5	370	421	791	283	413	696	2,13	113 %
2001	60	0	60	1 178	0,05	480	0,46	5	268	880	1 148	208	875	1 083	4,49	239 %
2002	168	0	168	1 197	0,14	393	0,47	3	520	686	1 206	352	683	1 035	3,52	187 %
2003	85	0	85	1 294	0,07	599	0,53	4	394	1 013	1 407	307	1 011	1 318	5,19	276 %
2004	106	0	106	1 370	0,08	462	0,41	1	384	677	1 061	277	677	954	3,48	185 %
2005	72	0	72	1 690	0,04	551	0,37	2	366	908	1 274	294	906	1 200	4,65	248 %
2006	104	0	104	1 588	0,07	439	0,34	2	346	758	1 104	242	756	998	3,88	207 %
2007	78	40	118	1 717	0,07	327	0,26	0	275	647	922	197	607	804	3,12	166 %
2008	240	15	255	1 700	0,15	410	0,39	2	599	605	1 204	359	588	947	3,03	161 %
2009	96	3	99	1 695	0,06	409	0,30	109	282	722	1 004	182	614	796	3,15	168 %
2010	138	44	182	1 929	0,09	434	0,32	94	295	898	1 193	143	774	917	3,97	211 %
2011	206	43	249	1 993	0,12	505	0,38	3	343	688	1 031	136	643	779	3,30	175 %
2012	81	2	83	1 909	0,04	349	0,23	1	171	530	701	89	528	617	3,08	164 %
2013	76	49	125	1 798	0,07	378	0,28	28	180	786	966	104	709	813	4,13	220 %
2014	164	0	164	1 773	0,09	247	0,23	6	319	278	597	153	274	427	1,60	85 %

Tableau VI. Bilan de l'exploitation des saumons dans la rivière Saint-Jean de 1984 à 2021

Année	Pêche sportive							Retraits divers	Retours à la rivière			Reproduction			Déposition d'œufs	
	Mad.	Réd.	Total	Jours- pêche		Succès Graciés	Succès ajusté		Mad.	Réd.	Total	Saumons disponibles			Œufs déposés (million)	Atteinte du seuil (optimal depuis 2016)
				Succès	Graciés							Mad.	Réd.	Total		
2015	214	50	264	1 863	0,14	511	0,42	9	499	744	1 243	280	690	970	4,04	215 %
2016	80	41	121	1 873	0,06	573	0,37	13	173	662	835	92	609	701	3,53	166 %
2017	50	0	50	1 502	0,03	329	0,25	11	131	554	685	81	543	624	3,15	148 %
2018	63	0	63	1 427	0,04	411	0,33	16	280	403	683	212	392	604	2,28	107 %
2019	65	30	95	1 585	0,06	588	0,43	13	189	716	905	119	678	797	3,92	185 %
2020	96	23	119	1 543	0,08	685	0,52	24	523	814	1 337	426	768	1 194	4,47	211 %
2021	179	16	195	1 731	0,11	945	0,66	0	459	787	1 246	280	771	1 051	4,49	212 %
Moyenne																
1984-2020	126	164	290	1 577	0,18	421	0,36	16	346	846	1 192	218	669	886	3,47	
2016-2020	71	19	90	1 586	0,06	517	0,38	15	259	630	889	186	598	784	3,47	
Variation																
2021 vs 2020	86%	-30%	64%	12%	46%	38%	26%		-12%	-3%	-7%	-34%	0%	-12%	0%	
2021 vs 1984-2020	42%	-90%	-33%	10%	-39%	125%	84%		33%	-7%	5%	29%	15%	19%	29%	
2021 vs 2016-2020	153%	-15%	118%	9%	99%	83%	72%		77%	25%	40%	51%	29%	34%	29%	

Ensemencements : 1984 : (S2) 16 000 1986 : (S2) 18 741 1987 : (S2) 4 188 ; (S3) 60 1989 : (T2) 5 487 ; (S2) 36 377 1990 : (S1) 7 967 ; (S2) 6 395 1991 : (T1) 6 289
1992 : (S1) 15 020 1995 : (œufs) 120 092 1996 : (œufs) 125 972 ; (AI) 84 691 1997 : (AI) 68 765 1998 : (AI) 47 000

Remarques : Retraits divers incluent les retraits piscicoles, les poissons trouvés morts, les pêches alimentaires, rituelles et sociales en rivière et, depuis 2015, un taux de mortalité de 7 % dans les remises à l'eau.

En 1999, la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1994-1998) de montaison de madeleineaux et de rédibermarins après la mi-saison.

Tableau VII. Bilan de l'exploitation des saumons dans la rivière de la Trinité de 1984 à 2021

Année	Pêche commerciale			Pêche sportive						Retraits divers	Retours à la rivière			Retours totaux	Reproduction			Déposition d'œufs	
	Mad.	Réd.	Total	Mad.	Réd.	Total	Jours-		Succès ajusté		Mad.	Réd.	Total		Saumons disponibles			Œufs déposés (million)	Atteinte du seuil (optimal depuis 2016)
							pêche	Succès Graciés							Mad.	Réd.	Total		
1984	34	555	589	415	132	547	2 474	0,22	0,22	1	1 771	468	2 239	2 828	1 355	336	1 691	2,19	134 %
1985	40	607	647	162	260	422	2 331	0,18	0,18	9	1 053	639	1 692	2 339	889	372	1 261	2,25	138 %
1986	14	606	620	510	227	737	2 284	0,32	0,32	3	1 589	621	2 210	2 830	1 076	394	1 470	2,43	149 %
1987	48	586	634	526	133	659	2 289	0,29	0,29	4	1 304	558	1 862	2 496	774	425	1 199	2,51	154 %
1988	57	522	579	596	94	690	2 680	0,26	0,26	6	1 639	813	2 452	3 031	1 037	719	1 756	4,17	256 %
1989	53	613	666	506	120	626	2 832	0,22	0,22	0	1 839	466	2 305	2 971	1 333	346	1 679	2,24	137 %
1990	144	524	668	668	164	832	3 110	0,27	0,27	2	1 905	530	2 435	3 103	1 235	366	1 601	2,32	142 %
1991	15	1 191	1 206	348	125	473	2 405	0,20	0,20	3	1 334	516	1 850	3 056	984	390	1 374	2,38	146 %
1992	56	638	694	222	151	373	2 693	0,14	0,14	3	577	612	1 189	1 883	354	459	813	3,26	200 %
1993	Fermée			172	57	229	2 676	0,09	0,09	1	410	271	681	681	238	213	451	1,55	95 %
1994	Fermée			184	34	218	2 274	0,10	0,10	0	579	309	888	888	395	275	670	2,05	126 %
1995	Fermée			104	117	221	2 125	0,10	0,10	2	348	671	1 019	1 019	244	552	796	3,82	235 %
1996	Fermée			182	66	248	2 445	0,10	0,10	2	661	434	1 095	1 095	477	368	845	2,71	167 %
1997	Fermée			156	61	217	2 397	0,09	0,09	2	394	558	952	952	237	496	733	3,45	211 %
1998	Fermée			112	80	192	2 642	0,07	0,07	2	524	385	909	909	410	305	715	2,26	138 %
1999	Fermée			66	47	113	1 675	0,07	0,07	3	396	381	777	777	327	334	661	2,41	148 %
2000	Fermée			37	16	53	1 234	0,05	0,05	1	250	251	501	501	213	234	447	1,68	103 %
2001	Fermée			24	36	60	901	0,07	3 0,07	0	100	187	287	287	76	151	227	1,05	64 %
2002	Fermée			71	0	71	726	0,10	23 0,13	0	404	108	512	512	333	108	441	0,90	55 %
2003	Fermée			68	18	86	834	0,10	13 0,12	0	385	218	603	603	317	200	517	1,51	92 %
2004	Fermée			54	0	54	862	0,06	25 0,09	0	334	230	564	564	280	230	510	1,69	104 %
2005	Fermée			51	0	51	644	0,08	10 0,09	6	277	149	426	426	222	147	369	1,10	68 %
2006	Fermée			120	0	120	735	0,16	18 0,19	2	515	357	872	872	395	355	750	2,58	159 %
2007	Fermée			123	0	123	931	0,13	32 0,17	0	601	249	850	850	478	249	727	1,92	118 %
2008	Fermée			112	0	112	788	0,14	42 0,20	3	628	325	953	953	516	322	838	2,43	149 %
2009	Fermée			23	0	23	627	0,04	20 0,07	2	229	216	445	445	206	214	420	1,54	95 %
2010	Fermée			101	4	105	681	0,15	18 0,18	1	611	258	869	869	509	254	763	1,97	121 %
2011	Fermée			201	5	206	986	0,21	79 0,29	0	949	317	1 266	1 266	748	312	1 060	2,48	152 %
2012	Fermée			64	0	64	973	0,07	43 0,11	1	263	286	549	549	199	285	484	2,22	136 %
2013	Fermée			37	0	37	736	0,05	50 0,12	1	172	226	398	398	135	225	360	1,74	107 %
2014	Fermée			35	0	35	694	0,05	17 0,07	3	235	65	300	300	199	63	262	0,56	34 %

Tableau VII. Bilan de l'exploitation des saumons dans la rivière de la Trinité de 1984 à 2021

Année	Pêche commerciale			Pêche sportive						Retraits divers	Retours à la rivière			Retours totaux	Reproduction			Déposition d'œufs		
	Mad.	Réd.	Total	Mad.	Réd.	Total	Jours-pêche	Succès	Graciés		Succès ajusté	Mad.	Réd.		Total	Mad.	Réd.	Total	Œufs déposés (million)	Atteinte du seuil (optimal depuis 2016)
2015	Fermée		121	0	121	817	0,15	41	0,20	4	571	140	711	711	448	138	586	1,23	76 %	
2016	Fermée		112	3	115	1 084	0,11	55	0,16	5	578	221	799	799	465	214	679	1,80	108 %	
2017	Fermée		43	1	44	1 055	0,04	47	0,09	3	212	264	476	476	169	260	429	2,00	121 %	
2018	Fermée		25	0	25	757	0,03	13	0,05	2	184	81	265	265	158	80	238	0,66	40 %	
2019	Fermée		25	0	25	872	0,03	32	0,07	9	150	99	249	249	120	95	215	0,76	46 %	
2020	Fermée		28	0	28	948	0,03	35	0,07	4	225	113	338	338	197	109	306	0,90	54 %	
2021	Fermée		74	2	76	1 045	0,07	107	0,18	9	770	98	868	868	689	94	783	1,00	60 %	
Moyenne																				
1984-2020					173	53	226	1 546	0,15	32	0,16	2	654	340	994	994	480	286	766	2,02
2016-2020					47	1	47	943	0,05	36	0,09	5	270	156	425	425	222	152	373	1,22
Variation																				
2021 vs 2020					164%		171%	10%	146%	206%	164%		242%	-13%	157%	157%	250%	-14%	156%	11%
2021 vs 1984-2020					-57%		-66%	-32%	-50%	232%	12%		18%	-71%	-13%	-13%	44%	-67%	2%	-51%
2021 vs 2016-2020					59%		60%	11%	45%	194%	97%		185%	-37%	104%	104%	211%	-38%	110%	-19%

Remarques : Retraits divers incluent les retraits piscicoles, les poissons trouvés morts et, depuis 2015, un taux de mortalité de 7 % dans les remises à l'eau.

La montaison a été estimée en ajoutant le nombre estimé de saumons qui ont monté pendant la semaine du 1^{er} au 7 juillet en considérant la proportion moyenne que représente cette période dans l'ensemble des montaisons des années 1992 à 2008.

Tableau VIII. Montaison totale des saumons par catégorie de groupe d'âge en mer dans la rivière Saint-Jean de 1984 à 2021

Année	Madeleineaux		Rédibermarins		Répartition des rédibermarins									Grand total
	n	%	n	%	Dibermarins			Tribermarins			Frai antérieur			
					n échant.	% estimé	n estimé	n échant.	% estimé	n estimé	n échant.	% estimé	n estimé	
1984	113	9	1 116	91	283	89	996	20	6	70	14	4	49	1 229
1985	61	7	795	93	263	92	734	16	6	45	6	2	17	856
1986	155	16	819	84	187	87	716	7	3	27	20	9	77	974
1987	563	34	1 069	66	208	91	971	1	0	5	20	9	93	1 632
1988	436	18	1 937	82	432	93	1 792	3	1	12	32	7	133	2 373
1989	262	16	1 375	84	448	94	1 286	11	2	32	20	4	57	1 637
1990	512	40	772	60	211	86	665	4	2	13	30	12	95	1 284
1991	437	23	1 487	77	465	95	1 405	2	0	6	25	5	76	1 924
1992	559	27	1 478	73	555	93	1 374	13	2	32	29	5	72	2 037
1993	619	36	1 102	64	466	93	1 027	5	1	11	29	6	64	1 721
1994	494	28	1 258	72	516	90	1 135	12	2	26	44	8	97	1 752
1995	245	18	1 138	82	403	96	1 097	5	1	14	10	2	27	1 383
1996	341	30	798	70	319	88	699	18	5	39	27	7	59	1 139
1997	304	34	598	66	184	90	539	3	1	9	17	8	50	902
1998	483	53	431	47	0	92	397	0	2	9	0	6	26	914
1999	324	31	736	69	0	92	677	0	2	15	0	6	44	1 060
2000	370	47	421	53	38	86	364	2	5	19	4	9	38	791
2001	268	23	880	77	91	93	817	0	0	0	7	7	63	1 148
2002	520	43	686	57	20	87	597	0	0	0	3	13	89	1 206
2003	394	28	1 013	72	51	98	994	1	2	19	0	0	0	1 407
2004	384	36	677	64	24	92	625	1	4	26	1	4	26	1 061
2005	366	29	908	71	2	91	826	0	2	18	0	7	64	1 274
2006	346	31	758	69	33	79	596	1	2	18	8	19	144	1 104
2007	275	30	647	70	45	94	607	1	2	13	2	4	27	922
2008	599	50	605	50	12	86	519	1	7	43	1	7	43	1 204
2009	282	28	722	72	51	89	646	0	0	0	6	11	76	1 004
2010	295	25	898	75	102	94	840	4	4	33	3	3	25	1 193
2011	343	33	688	67	44	100	688	0	0	0	0	0	0	1 031
2012	171	24	530	76	1	93	493	0	3	16	0	5	27	701
2013	180	19	786	81	81	96	758	2	2	19	1	1	9	966
2014	319	53	278	47	3	93	259	0	3	8	0	4	11	597

Tableau VIII. Montaison totale des saumons par catégorie de groupe d'âge en mer dans la rivière Saint-Jean de 1984 à 2021

Année	Madeleineaux		Rédibermarins		Répartition des rédibermarins									Grand total
	n	%	n	%	Dibermarins			Tribermarins			Frai antérieur			
					n échant.	%	n estimé	n échant.	%	n estimé	n échant.	%	n estimé	
2015	499	40	744	60	60	98	732	0	0	0	1	2	12	1 243
2016	173	21	662	79	74	100	662	0	0	0	0	0	0	835
2017	131	19	554	81	9	98	543	1	1	6	2	1	6	685
2018	280	41	403	59	11	98	395	0	1	4	0	1	4	683
2019	189	21	716	79	34	89	641	3	8	57	1	3	19	905
2020	523	39	814	61	40	95	775	1	2	19	1	2	19	1 337
2021	459	37	787	63	13	87	682	0	0	0	2	13	105	1 246
Moyenne														
1984-2021	349	29	844	71	152	92	778	4	2	18	10	6	48	1 194
2016-2020	259	29	630	71	34	96	603	1	3	17	1	2	10	889

Estimations obtenues en faisant la moyenne des cinq dernières années pour lesquelles un minimum de 15 individus ont été âgés.

Tableau IX. Montaison totale des saumons par catégorie de groupe d'âge en mer dans la rivière de la Trinité de 1984 à 2021

Année	Madeleineaux ¹		RédiBERmarins ¹		Répartition des rédiBERmarins ¹									Grand total
	n	%	n	%	Dibermarins		TriBERmarins			Frai antérieur				
					n échant.	% estimé	n échant.	%	n estimé	n échant.	%	n estimé		
1984	1 805	64	1 023	36	594	87	888	0	0	0	90	13	135	2 828
1985	1 093	47	1 246	53	789	92	1 143	7	1	10	65	8	94	2 339
1986	1 603	57	1 227	43	752	92	1 129	4	0	6	62	8	93	2 830
1987	1 352	54	1 144	46	655	92	1 053	0	0	0	57	8	91	2 496
1988	1 696	56	1 335	44	567	93	1 243	0	0	0	42	7	92	3 031
1989	1 892	64	1 079	36	633	87	943	0	0	0	91	13	136	2 971
1990	2 049	66	1 054	34	571	84	882	0	0	0	112	16	172	3 103
1991	1 349	44	1 707	56	1 227	93	1 595	0	0	0	86	7	112	3 056
1992	633	34	1 250	66	732	93	1 165	5	1	9	48	6	77	1 883
1993	410	60	271	40	50	88	238	0	0	0	7	12	33	681
1994	579	65	309	35	27	82	253	0	0	0	6	18	56	888
1995	348	34	671	66	99	93	621	0	0	0	8	7	50	1 019
1996	661	60	434	40	55	87	379	0	0	0	8	13	55	1 095
1997	394	41	558	59	35	65	362	0	0	0	19	35	196	952
1998	524	58	385	42	67	86	331	0	0	0	11	14	54	909
1999	396	51	381	49	40	89	339	0	0	0	5	11	42	777
2000	250	50	251	50	12	86	215	0	0	0	2	14	36	501
2001	100	35	187	65	25	74	138	0	0	0	9	26	50	287
2002	404	79	108	21	10	45	49	0	0	0	12	55	59	512
2003	385	64	218	36	68	81	176	0	0	0	16	19	42	603
2004	334	59	230	41	29	88	202	0	0	0	4	12	28	564
2005	277	65	149	35	17	65	97	0	0	0	9	35	52	426
2006	515	59	357	41	22	51	183	0	0	0	21	49	174	872
2007	601	71	249	29	64	69	171	0	0	0	29	31	78	850
2008	628	66	325	34	42	66	213	0	0	0	22	34	112	953
2009	229	51	216	49	12	67	144	0	0	0	6	33	72	445
2010	611	70	258	30	42	66	169	0	0	0	22	34	89	869
2011	949	75	317	25	53	78	247	0	0	0	15	22	70	1 266
2012	263	48	286	52	70	80	230	0	0	0	17	20	56	549
2013	172	43	226	57	42	66	148	1	2	4	21	33	74	398
2014	235	78	65	22	22	61	40	0	0	0	14	39	25	300

Tableau IX. Montaison totale des saumons par catégorie de groupe d'âge en mer dans la rivière de la Trinité de 1984 à 2021

Année	Madeleineaux ¹		Rédibermarins ¹		Répartition des rédibermarins ¹									Grand total
	n	%	n	%	Dibermarins		Tribemmarins			Frai antérieur				
					n échant.	% estimé	n échant.	%	n estimé	n échant.	%	n estimé		
2015	571	80	140	20	36	78	110	0	0	0	10	22	30	711
2016	578	72	221	28	72	89	196	0	0	0	9	11	25	799
2017	212	45	264	55	45	73	192	0	0	0	17	27	72	476
2018	184	69	81	31	34	87	71	0	0	0	5	13	10	265
2019	150	60	99	40	57	79	78	0	0	0	15	21	21	249
2020	225	67	113	33	74	89	101	0	0	0	9	11	12	338
2021	770	89	98	11	50	83	82	0	0	0	10	17	16	868
Moyenne														
1984-2021	669	58	488	42	205	85	416	0	0	1	27	15	71	1 157
2016-2020	270	63	156	37	56	82	128	0	0	0	11	18	28	425

¹ Y compris la pêche commerciale.

Tableau X. Caractéristiques des ombles de fontaine anadromes dans la passe migratoire de la rivière de la Trinité de 1997 à 2021

Année	Montaison	Échantillon (n)	Longueurs totales		
			Minimum	Maximum	Moyenne
1997	918	918	15	70	35
1998	1 345	1 345	15	70	35
1999	1 177	1 177	10	70	34
2000	1 119	1 027	15	60	36
2001	1 516	803	20	60	35
2002*	2 516	2 516	10	60	26
2003	4 495	4 495	10	65	26
2004	3 050	3 050	10	60	26
2005	2 001	2 001	10	60	26
2006	4 186	4 186	5	60	23
2007	4 480	4 480	10	65	25
2008	5 922	5 922	10	60	24
2009**	1 381	1 381	10	60	30
2010***	4 334	4 317	5	60	27
2011	4 859	4 859	10	65	29
2012	4 123	4 123	10	60	30
2013	1 500	1 500	15	60	35
2014	1 646	1 406	15	60	33
2015	3 280	3 280	15	60	31
2016	3 473	3 473	10	65	30
2017	1 440	1 439	10	60	34
2018	1 917	1 917	10	55	28
2019	2 526	2 498	15	60	31
2020	6 265	6 265	10	60	24
2021	4 884	4 884	10	55	27
Moyenne 2002-2021	3 521	3 506	10	61	27
Moyenne 2016-2020	3 124	3 118	11	60	28

* Modification du plancher de la cage de rétention de la passe migratoire permettant la capture de petits ombles de fontaine.

** Année exclue des calculs puisque la barrière de comptage ne permet pas la capture des petits ombles de fontaine et n'était pas en fonction du 1^{er} au 7 juillet.

*** Depuis 2010, la passe migratoire a été reconstruite et présente des caractéristiques différentes pouvant influencer les captures d'ombles de fontaine.

Tableau XI. Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière Saint-Jean en 2021

	Madeleineaux			Rédibermarins			Dibermarins			Frai antérieur		
	Mâles	Femelles	Tous	Mâles	Femelles	Tous	Mâles	Femelles	Tous	Mâle	Femelles	Tous
Poids (kg)												
n	70	1	148	2	10	15	1	9	13	1	1	2
Moyenne	1,48	1,80	1,53	4,50	4,64	4,58	3,10	4,28	4,23	5,90	7,90	6,90
Minimum	1,10	1,80	1,10	3,10	3,04	3,04	3,10	3,04	3,04	5,90	7,90	5,90
Maximum	2,61	1,80	2,61	5,90	7,90	7,90	3,10	5,01	5,01	5,90	7,90	7,90
Écart-type	0,27		0,26	4,50	4,64	1,17		0,62	0,64			1,41
Longueur à la fourche (cm)												
n	77	1	179	1	10	14	1	9	13		1	1
Moyenne	55,3	59,0	55,5	75,0	80,1	78,7	75,0	78,4	77,4		95,0	95,0
Minimum	49,0	59,0	49,0	75,0	73,0	73,0	75,0	73,0	73,0		95,0	95,0
Maximum	62,0	59,0	62,0	75,0	95,0	95,0	75,0	82,0	82,0		95,0	95,0
Écart-type	2,85		2,69		5,86	5,42		2,79	2,82			
Facteur de condition de Fulton												
n	70	1	148	1	10	14	1	9	13		1	1
Moyenne	0,87	0,88	0,90	0,73	0,89	0,91	0,73	0,88	0,91		0,92	0,92
Minimum	0,70	0,88	0,70	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73		0,92	0,92
Maximum	1,19	0,88	1,19	0,73	1,10	1,12	0,73	1,10	1,12		0,92	0,92
Écart-type	0,11		0,12		0,11	0,12		0,11	0,13			
Sexe												
n	77	1	78	2	10	12	1	9	10	1	1	2
	99 %	1 %		17 %	83 %		10 %	90 %		50 %	50 %	
Âge à la smoltification												
		Nombre			Nombre			Nombre			Nombre	
2 ans		9	6 %		1	7 %		1	8 %		0	0 %
3 ans		100	63 %		13	87 %		11	85 %		2	100 %
4 ans		49	31 %		1	7 %		1	8 %		0	0 %
5 ans		1	1 %		0	0 %		0	0 %		0	0 %
Total		159	100 %		15	100 %		13	100 %		2	100 %

Note : Le tableau présente les poids et longueurs des poissons conservés, remis à l'eau ou trouvés morts.

Tableau XII. Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière de la Trinité en 2021

	Madeleineaux			Rédibermarins			Répartition des rédibermarins							
	Mâles	Femelles	Tous	Mâles	Femelles	Tous	Dibermarins			Frai antérieur				
							Mâles	Femelles	Tous	Mâles	Femelles	Tous		
Poids (kg)														
n	59	3	68	2		2				2			2	
Moyenne	1,64	1,33	1,61	2,37		2,37				2,37			2,37	
Minimum	1,20	1,28	1,20	2,30		2,30				2,30			2,30	
Maximum	2,34	1,36	2,34	2,44		2,44				2,44			2,44	
Écart-type	0,25	0,05	0,25	0,10		0,10				0,10			0,10	
Longueur à la fourche (cm)														
n	61	3	76	2		60			50	2			10	
Moyenne	53,2	49,2	53,1	61		74,6			73,1	61			82,0	
Minimum	47,5	47,0	47,0	60		59,8			66,0	60			59,8	
Maximum	60,8	51,0	66,0	62		100,0			83,0	62			100,0	
Écart-type	3,14	2,03	3,46	2		7,01			3,49	1,56			13,57	
Facteur de condition de Fulton														
n	59	3	68	2		2				2			2	
Moyenne	1,08	1,12	1,08	1,05		1,05				1,05			1,05	
Minimum	0,92	1,03	0,92	0,97		0,97				0,97			0,97	
Maximum	1,22	1,23	1,23	1,14		1,14				1,14			1,14	
Écart-type	0,07	0,10	0,07	0,12		0,12				0,12			0,12	
Sexe (n)														
n	61	3	64	2	0	2			0	2	0		2	
	95 %	5 %		100 %	0 %					100 %	0 %			
Âge à la smoltification														
		Nombre		Nombre			Nombre			Nombre			Nombre	
2 ans		1	1 %	9	18 %		6	14 %		3	43 %		3	43 %
3 ans		66	90 %	40	80 %		37	86 %		3	43 %		3	43 %
4 ans		6	8 %	1	2 %		0	0 %		1	14 %		1	14 %
5 ans		0	0 %	0	0 %		0	0 %		0	0 %		0	0 %
Total		73	100 %	50	100 %		43	100 %		7	100 %		7	100 %

Notes : Pour les madeleineaux, les données de poids et de longueur proviennent des poissons conservés ou trouvés morts.

Pour les rédibermarins, les données proviennent de l'échantillonnage effectué dans la passe migratoire par le personnel technique sur les poissons vivants ou des poissons trouvés morts.

Tableau XIII. Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière Saint-Jean de 1983 à 2021

	Madeleineaux				Dibermarins				Tribermarins				Frai antérieur			
	Échant.*	LF	Poids	Femelles	Échant.*	LF	Poids	Femelles	Échant.*	LF	Poids	Femelles	Échant.*	LF	Poids	Femelles
	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n %	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n %	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n %	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n %
1983	16			16 0,0	55			55 65,5	2			2 50,0	6			6 50,0
1984	2			2 0,0	15			15 60,0	0			0	1			1 100,0
1985	5			5 0,0	83			83 60,2	5			5 0,0	2			2 0,0
1986	13			13 7,7	38			38 50,0	1			1 100,0	5			5 60,0
1987	18			18 5,6	44			44 70,5	0			0	10			10 60,0
1988	113	54,9	1,60	91 1,1	431	74,7	4,25	194 61,9	2		7,70	0	39	79,0	5,16	17 23,5
1989	99	54,1	1,57	86 0,0	448	75,7	4,33	305 72,8	11	90,1	8,01	8 87,5	20	87,1	6,90	16 50,0
1990	206	54,8	1,71	180 0,6	211	75,6	4,47	152 66,4	4	90,5	7,84	3 100,0	30	89,8	7,50	16 56,3
1991	140	53,2	1,49	62 0,0	462	74,6	4,15	222 64,9	2	90,0	7,85	0	25	89,4	7,95	10 70,0
1992	284	54,4	1,65	128 0,0	555	76,2	4,55	262 74,0	13	91,6	8,20	9 88,9	29	90,0	7,90	16 62,5
1993	313	53,7	1,54	66 1,5	463	74,3	4,17	155 69,7	5	91,3	7,96	0	29	93,5	9,23	15 86,7
1994	248	53,6	1,60	106 4,7	515	75,8	4,53	204 71,6	12	91,3	8,23	4 100,0	44	90,0	8,11	17 47,1
1995	78	53,2	1,47	43 2,3	400	75,5	4,35	198 68,7	5	88,4	7,14	3 100,0	10	85,2	6,72	7 28,6
1996	152	55,2	1,70	60 1,7	319	75,8	4,44	118 66,9	18	91,5	8,16	6 83,3	27	94,0	9,18	15 60,0
1997	127	55,1	1,71	36 0,0	184	76,4	4,66	57 70,2	3	89,8	7,60	0	17	90,1	7,52	6 83,3
1998	169	54,3	1,66	48 0,0	0			0	0			0	0			0
1999	38	55,9	1,76	38 0,0	0			0	0			0	0			0
2000	88	56,0	1,70	27 0,0	38	75,7	4,53	8 75,0	1		5,40	0	4	78,0	7,27	4 50,0
2001	61	56,5	1,74	6 0,0	91	77,0		4 75,0	0			0	7	98,6		4 75,0
2002	167	56,7	1,78	50 2,0	19	79,0	4,40	1 0,0	0			0	3	96,3		0
2003	92	56,5	1,77	32 0,0	51	79,7	5,85	1 100,0	1	83,0		0	0			0
2004	105	57,1	1,76	61 4,9	23	79,2		0	1	96,0		0	1	94,0		0
2005	69	56,5	1,73	33 3,0	2	74,5	4,00	2 50,0	0			0	0			0
2006	115	56,0	1,71	28 3,6	27	81,8	5,20	1 100,0	1	94,0		0	6	95,5	9,20	1 0,0
2007	77	55,5	1,65	28 7,1	37	74,3	4,13	14 78,6	1	93,0	8,00	0	2	97,5	6,00	1 100,0
2008	240	56,4	1,72	93 0,0	12	77,1	4,58	5 80,0	1	89,0	7,50	1 100,0	1	84,0	6,00	1 0,0
2009	100	56,1	1,59	31 0,0	48	77,6	4,23	19 84,2	0			0	6	99,0		3 33,3
2010	152	55,4	1,55	51 0,0	98	76,7	4,44	57 68,4	4	85,3	7,00	4 50,0	3	103,0		3 100,0
2011	207	56,9	1,80	83 0,0	44	79,6	4,89	15 80,0	0			0	0			0
2012	81	54,5	1,60	31 0,0	1	78,0	4,80	0	0			0	0			0
2013	77	56,2	1,65	31 0,0	67	76,4	4,22	50 70,0	2	90,3	8,50	2 100,0	1	91,0	7,60	1 100,0
2014	166	54,1	1,53	74 2,7	3	77,3	4,13	3 33,3	0			0	0			0

Tableau XIII. Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière Saint-Jean de 1983 à 2021

	Madeleineaux					Dibermarins					Tribermarins					Frai antérieur					
	Échant.*		LF	Poids	Femelles	Échant.*		LF	Poids	Femelles	Échant.*		LF	Poids	Femelles	Échant.*		LF	Poids	Femelles	
	n	\bar{x}	(cm)	\bar{x}	(kg)	n	%	n	\bar{x}	(cm)	\bar{x}	(kg)	n	%	n	\bar{x}	(cm)	\bar{x}	(kg)	n	%
2015	226		55,5	1,70	92	1,1	60	78,0	4,50	28	78,6	0			0	1	101,0	10,20	1	100,0	
2016	80		54,1	1,51	30	0,0	74	76,8	4,51	41	58,5	0			0					0	
2017	51		53,1	1,36	31	6,5	9	78,6	5,89	2	100,0	1	94,0	11,40	1	100,0	2	92,5	9,10	1	100,0
2018	68		53,0	1,36	36	0,0	12	77,3	4,62	8	25,0	0			0					0	
2019	69		53,3	1,41	26	7,7	34	75,5	4,19	29	65,5	3	89,7	6,62	2	100,0	1	92,0	7,00		0
2020	96		54,8	1,61	49	2,0	40	78,2	4,56	37	75,7	1	89,0		1	100,0	1	83,0	5,72		0
2021	179		55,5	1,53	78	1,3	13	77,4	4,23	10	90,0	0			0		2	95,0	6,90	2	50,0
Moyenne			55,0	1,64	1,5		75,8	4,38	68,6			90,7	7,97	78,8			91,0	7,61	56,4		

LT : Longueur totale LF : Longueur à la fourche

* Certaines caractéristiques ne sont pas connues pour tous les échantillons. Pour plus de précisions sur l'année à l'étude, voir le tableau XI.

Tableau XIV. Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière de la Trinité de 1980 à 2021

	Madeleineaux				Dibermarins				Tribermarins				Frai antérieur			
	Échant.*	LF	Poids	Femelles	Échant.*	LF	Poids	Femelles	Échant.*	LF	Poids	Femelles	Échant.*	LF	Poids	Femelles
	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n %	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n %	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n %	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n %
1980	372		1,71	354 5,4	30		4,53	28 78,6	0			0	9		3,78	9 33,3
1981	317		1,51	296 4,1	21		4,00	20 100,0	0			0	3		4,20	3 33,3
1982	241		1,60	213 3,3	62		3,96	55 81,8	0			0	2		7,73	1 0,0
1983	123	51,7	1,57	116 2,6	73	72,1	3,94	65 89,2	0			0	4	87,0	6,92	4 50,0
1984	406	51,1	1,45	362 11,0	112	70,5	3,64	101 82,2	0			0	17	77,1	4,84	15 26,7
1985	150	49,8	1,33	109 1,8	232	71	3,78	168 95,2	2		6,83	2 100,0	19	72,6	4,86	12 25,0
1986	479	50,8	1,38	368 4,1	195	70,9	3,74	152 82,2	1	81,0	5,65	1 100,0	15	73,7	4,67	11 36,4
1987	500	51,9	1,47	333 8,4	116	72,4	4,01	83 86,7	0			0	10	74,3	4,60	6 0,0
1988	556	53,4	1,65	364 9,1	81	73,4	4,12	58 93,1	0			0	6	81,3	6,73	6 33,3
1989	482	54,4	1,67	292 7,9	97	72,5	3,91	64 89,1	0			0	14	75,6	5,22	7 42,9
1990	647	54,6	1,74	463 8,2	133	74,4	4,33	98 91,8	0			0	26	79,7	5,70	19 26,3
1991	344	54,6	1,66	183 7,7	114	73,2	3,94	68 97,1	0			0	8	75,8	4,69	5 40,0
1992	218	54,7	1,69	139 16,5	137	74,2	4,23	94 97,9	0			0	9	68,6	3,15	5 40,0
1993	164	55,9	1,80	125 7,2	50	73,2	4,01	37 97,3	0			0	7	85,3	6,22	7 100,0
1994	166	55,1	1,78	127 9,4	27	75,6	4,53	18 100,0	0			0	6	90,4	7,90	6 83,3
1995	100	55,3	1,79	69 7,2	97	74,4	4,26	69 100,0	0			0	8	75,1	4,96	2 0,0
1996	179	56,7	1,97	130 14,6	55	76,5	4,69	39 94,9	0			0	8	84,3	6,33	2 100,0
1997	151	57	2,05	112 9,8	35	75,5	4,50	31 96,8	0			0	19	88,0	7,32	16 81,3
1998	107	56,5	1,98	79 15,2	67	76,3	4,65	55 96,4	0			0	11	79,7	5,63	8 12,5
1999	64	59,9	2,20	39 12,8	40	77,3	4,79	32 96,9	0			0	5	98,9	10,71	3 66,7
2000	34	56,5	1,99	23 0,0	12	75,6	4,40	10 100,0	0			0	2	76,5	5,16	2 50,0
2001	23	59,8	2,07	19 15,8	25	77,5	4,60	25 96,0	0			0	9	80,3	5,48	8 87,5
2002	72	59,2	2,07	57 24,6	10	75,5		0	0			0	12	84,7		0
2003	55	57,4	2,04	53 13,2	60	77,1	4,88	15 100,0	0			0	8	89,9	2,83	1 0,0
2004	53	57,2	2,08	50 30,0	29	76,7		0	0			0	4	94,0		0
2005	44	56	1,87	42 26,2	17	75,4	4,28	1 100,0	0			0	9	91,8		0
2006	121	56,9	2,09	107 12,1	22	77,1	4,55	1 100,0	0			0	21	83,1		0
2007	123	54,2	1,85	111 11,7	64	75,6		0	0			0	29	85,0		0
2008	113	56,8	1,95	105 4,8	40	73,8	5,35	1 100,0	0			0	22	83,1		0
2009	40	54,9	1,72	19 5,3	12	73,7		0	0			0	5	75,5		0
2010	102	53,5	1,61	87 11,5	41	74,8		0	0			0	21	84,5	2,23	3 0,0
2011	201	55,4	1,81	195 13,8	53	76		0	0			0	15	78,6	2,44	4 0,0
2012	64	52,3	1,53	59 0,0	64	75,5	4,60	1 100,0	0			0	17	88,5		0
2013	36	54,2	1,69	34 11,8	38	76		0	0			0	19	86,4		0
2014	36	54,4	1,68	27 3,7	22	72,2	3,80	1 100,0	0			0	14	84,4		0

Tableau XIV. Caractéristiques des saumons échantillonnés dans la rivière de la Trinité de 1980 à 2021

	Madeleineaux					Dibermarins					Tribermarins					Frai antérieur								
	Échant.*		LF		Poids		Femelles		Échant.*		LF		Poids		Femelles		Échant.*		LF		Poids		Femelles	
	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n	%	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n	%	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n	%	n	\bar{x} (cm)	\bar{x} (kg)	n	%	n	%		
2015	122	54,5	1,78	108	10,2	36	76		0		0		0		10	91,7		0						
2016	112	52,8	1,59	102	11,8	71	75,7		0		0		0		7	67,9	2,30	3	0,0					
2017	43	51,9	1,49	43	23,3	45	72,6		0		0		0		17	84,2		1	0,0					
2018	23	53,1	1,62	22	4,5	34	74,2		0		0		0		5	84,3		0						
2019	27	52,1	1,42	26	11,5	57	74,8		2	100,0	0		0		15	85,7		0						
2020	27	53,5	1,57	27	3,7	74	72,8	4,93	2	100,0	0		0		9	87,2		0						
2021	76	53,1	1,61	64	4,7	50	73,1		0		0		0		10	82,0	2,37	2	0,0					
Moyenne		54,0	1,67	8,8		72,1	4,08	91,5			81,0	6,44	100,0		79,9	5,36	40,4							

LT : Longueur totale LF : Longueur à la fourche

* Certaines caractéristiques ne sont pas connues pour tous les échantillons. Pour plus de précisions sur l'année à l'étude, voir le tableau XII.

Tableau XV. Survie en rivière, de l'œuf au smolt, dans la rivière Saint-Jean de 1985 à 2021

Année	Rivière Saint-Jean										
	Œufs déposés	Nombre par groupe d'âge					Taux de survie (%) par groupe d'âge				
		2	3	4	5	Tous	2	3	4	5	Tous
1985	2 251 024	1 011	39 960	33 685	6 437	81 091	0,04	1,78	1,50	0,29	3,60
1986	2 662 146	1 033	59 058	65 009	4 100	129 200	0,04	2,22	2,44	0,15	4,85
1987	3 784 154	2 187	39 907	68 060	687	110 841	0,06	1,05	1,80	0,02	2,93
1988	6 333 209	2 575	82 000	87 295	2 522	174 392	0,04	1,29	1,38	0,04	2,75
1989	4 110 301	820	52 927	49 065	2 906	105 718	0,02	1,29	1,19	0,07	2,57
1990	2 439 925	2 062	21 552	38 302	5 576	67 492	0,08	0,88	1,57	0,23	2,77
1991	4 674 652	1 146	17 962	49 254	3 819	72 182	0,02	0,38	1,05	0,08	1,54
1992	4 380 684	1 057	45 537		0		0,02	1,04		0,00	
1993	3 046 972	4 647		14 221	2 042		0,15		0,47	0,07	
1994	3 478 492	4 852	64 260	42 370	4 838	116 320	0,14	1,85	1,22	0,14	3,34
1995	3 556 483	17 382	65 342	21 501	1 690	105 915	0,49	1,84	0,60	0,05	2,98
1996	2 150 090	4 594	23 114	38 028	876	66 613	0,21	1,08	1,77	0,04	3,10
1997	1 975 262	1 613	56 620	17 960	506	76 699	0,08	2,87	0,91	0,03	3,88
1998	2 218 708	13 521	44 680	14 179	0	72 380	0,61	2,01	0,64	0,00	3,26
1999	3 775 376	8 323	44 055	15 082	1 920	69 380	0,22	1,17	0,40	0,05	1,84
2000	2 130 047	1 519	35 909	35 201	4 632	77 261	0,07	1,69	1,65	0,22	3,63
2001	4 490 633	3 830	56 961	40 146	10 958	111 895	0,09	1,27	0,89	0,24	2,49
2002	3 516 001	1 920	55 072	45 765	464	103 221	0,05	1,57	1,30	0,01	2,94
2003	5 192 382	3 088	76 704	15 558	186	95 537	0,06	1,48	0,30	0,00	1,84
2004	3 481 041	1 934	28 562	11 376	502	42 373	0,06	0,82	0,33	0,01	1,22
2005	4 654 184	1 393	23 497	10 039	853	35 782	0,03	0,50	0,22	0,02	0,77
2006	3 883 435	2 238	35 638	13 081	204	51 161	0,06	0,92	0,34	0,01	1,32
2007	3 118 202	2 008	28 721	9 381	748	40 858	0,06	0,92	0,30	0,02	1,31
2008	3 030 122	2 559	23 656	9 353	724	36 292	0,08	0,78	0,31	0,02	1,20
2009	3 153 183	7 546	23 942	27 142	526	59 156	0,24	0,76	0,86	0,02	1,88
2010	3 969 964	2 806	26 780		1 576		0,07	0,67		0,04	
2011	3 299 019	1 809		16 941	1 448		0,05		0,51	0,04	
2012	3 084 276	3 114	35 851	11 822	500	51 286	0,10	1,16	0,38	0,02	1,66
2013	4 134 251	3 940	20 508	13 987	0	38 435	0,10	0,50	0,34	0,00	0,93
2014	1 601 551	483	23 228	4 208	0	27 919	0,03	1,45	0,26	0,00	1,74
2015	4 038 239	500	31 451	12 957	860	45 768	0,01	0,78	0,32	0,02	1,13
2016	3 528 294	1 329	23 628	8 604			0,04	0,67	0,24		
2017	3 146 086	1 524	50 331				0,05	1,60			
2018	2 277 356	860					0,04				
2019	3 923 334										
2020	4 474 778										
2021	4 490 916										
Moyenne	3 498 778						0,10	1,16	0,82	0,06	2,22

Ces estimations sont basées sur le nombre de smolts produits d'un âge donné et sur la déposition d'œufs associée à cette cohorte, par rapport aux observations des cinq années précédentes ou suivantes.

Cette estimation provient de la proportion de smolts de 2 ans observés en 1997 multipliée par la moyenne de la production de smolts de 1989 à 1999.

Tableau XVI. Survie en rivière, de l'œuf au smolt, dans la rivière de la Trinité de 1980 à 2021

Année	Rivière de la Trinité										
	Œufs déposés	Nombre par groupe d'âge					Taux de survie (%) par groupe d'âge				
		2	3	4	5	Tous	2	3	4	5	Tous
1980	1 717 436	5 476	58 256	4 609	0	68 341	0,32	3,39	0,27	0,00	3,98
1981	1 416 661	8 981	49 936	9 328	0	68 245	0,63	3,52	0,66	0,00	4,82
1982	3 886 723	11 524	79 288	12 292	0	103 104	0,30	2,04	0,32	0,00	2,65
1983	2 364 651	7 929	61 110	4 962	256	74 257	0,34	2,58	0,21	0,01	3,14
1984	2 191 974	4 214	27 744	4 860	261	37 079	0,19	1,27	0,22	0,01	1,69
1985	2 254 762	19 173	52 689	6 780	0	78 642	0,85	2,34	0,30	0,00	3,49
1986	2 425 953	22 252	39 376	6 518	0	68 146	0,92	1,62	0,27	0,00	2,81
1987	2 507 970	3 912	31 086	6 452	651	42 100	0,16	1,24	0,26	0,03	1,68
1988	4 166 199	3 259	39 703	6 508	388	49 858	0,08	0,95	0,16	0,01	1,20
1989	2 239 664	4 715	73 536	6 213	0	84 463	0,21	3,28	0,28	0,00	3,77
1990	2 319 842	5 531	44 264	11 765	0	61 561	0,24	1,91	0,51	0,00	2,65
1991	2 378 498	5 048	49 349	5 381	0	59 778	0,21	2,07	0,23	0,00	2,51
1992	3 259 413	10 785	53 495	5 091	0	69 371	0,33	1,64	0,16	0,00	2,13
1993	1 551 203	2 216	24 705	5 250	0	32 171	0,14	1,59	0,34	0,00	2,07
1994	2 048 734	2 096	20 832	4 541	0	27 470	0,10	1,02	0,22	0,00	1,34
1995	3 824 510	2 879	40 044	4 336	0	47 259	0,08	1,05	0,11	0,00	1,24
1996	2 714 526	11 972	26 376	2 344	0	40 691	0,44	0,97	0,09	0,00	1,50
1997	3 445 827	9 033	60 473	2 788	213	72 507	0,26	1,75	0,08	0,01	2,10
1998	2 257 500	7 501	36 945	5 750	0	50 196	0,33	1,64	0,25	0,00	2,22
1999	2 408 173	4 531	42 168	3 551	148	50 399	0,19	1,75	0,15	0,01	2,09
2000	1 678 721	4 898	21 753	2 374	41	29 066	0,29	1,30	0,14	0,00	1,73
2001	1 051 051	1 998	29 971	1 413	212	33 594	0,19	2,85	0,13	0,02	3,20
2002	897 879	2 374		2 762	160		0,26		0,31	0,02	
2003	1 505 579	3 867	37 186	2 880	0	43 933	0,26	2,47	0,19	0,00	2,92
2004	1 687 073	2 762	28 637	2 723	0	34 122	0,16	1,70	0,16	0,00	2,02
2005	1 100 834	3 360	28 237	3 659	0	35 255	0,31	2,57	0,33	0,00	3,20
2006	2 584 465	1 720	29 817	2 467	222	34 226	0,07	1,15	0,10	0,01	1,32
2007	1 918 151	4 024	37 448	3 778	0	45 250	0,21	1,95	0,20	0,00	2,36
2008	2 426 935	4 485	29 998	4 026	197	38 706	0,18	1,24	0,17	0,01	1,59
2009	1 541 118	11 110	31 572	3 547	0	46 229	0,72	2,05	0,23	0,00	3,00
2010	1 967 892	6 780	21 873	1 903	284	30 840	0,34	1,11	0,10	0,01	1,57
2011	2 481 641	5 124	38 370	7 659	545	51 698	0,21	1,55	0,31	0,02	2,08
2012	2 219 497	7 293	32 056	5 632	0	44 982	0,33	1,44	0,25	0,00	2,03
2013	1 741 824	2 269	19 984	3 861	0	26 115	0,13	1,15	0,22	0,00	1,50
2014	561 821	1 272	20 333	0	0	21 605	0,23	3,62	0,00	0,00	3,85
2015	1 234 363	11 325	24 815	778	285	37 202	0,92	2,01	0,06	0,02	3,01
2016	1 798 098	3 415	33 188	3 699			0,19	1,85	0,21		
2017	2 002 380	4 926	37 273				0,25	1,86			
2018	664 348	1 423					0,21				
2019	757 965										
2020	896 063										
2021	996 526										
Moyenne	2 026 058						0,29	1,75	0,22	0,00	2,26

Ces estimations sont basées sur le nombre de smolts produits d'un âge donné et sur la déposition d'œufs associée à cette cohorte, par rapport aux observations des cinq années précédentes ou suivantes.

Tableau XVII. Taux de retour de la mer, du smolt jusqu'à l'adulte, dans la rivière Saint-Jean de 1989 à 2021

Année	<i>Rivière Saint-Jean</i>							
	Smolts	Mad. an + 1	Diber. an + 2	Triber. an + 3	Taux de retour (%) du smolt à :			
					Mad.	Diber.	Triber.	Tous
1989	92 396	512	1 405	32	0,55	1,52	0,03	2,11
1990	97 768	437	1 374	11	0,45	1,41	0,01	1,86
1991	113 745	559	1 027	26	0,49	0,90	0,02	1,42
1992	154 790	619	1 135	14	0,40	0,73	0,01	1,14
1993	142 764	494	1 097	39	0,35	0,77	0,03	1,14
1994	73 961	245	699	9	0,33	0,95	0,01	1,29
1995	59 999	341	539	9	0,57	0,90	0,01	1,48
1996	104 895	304	397	15	0,29	0,38	0,01	0,68
1997		483	677	19				
1998	95 475	324	364	0	0,34	0,38	0,00	0,72
1999	114 035	370	817	0	0,32	0,72	0,00	1,04
2000	50 653	268	597	19	0,53	1,18	0,04	1,75
2001	109 399	520	994	26	0,48	0,91	0,02	1,41
2002	71 649	394	625	18	0,55	0,87	0,03	1,45
2003	59 847	384	826	18	0,64	1,38	0,03	2,05
2004	54 558	366	596	13	0,67	1,09	0,02	1,79
2005	95 755	346	607	43	0,36	0,63	0,05	1,04
2006	102 702	275	519	0	0,27	0,50	0,00	0,77
2007	135 098	599	646	33	0,44	0,48	0,02	0,95
2008	45 774	282	840	0	0,62	1,84	0,00	2,45
2009	37 086	295	688	16	0,80	1,86	0,04	2,69
2010	47 987	343	493	19	0,71	1,03	0,04	1,78
2011	45 050	171	758	8	0,38	1,68	0,02	2,08
2012	40 585	180	259	0	0,44	0,64	0,00	1,08
2013	36 623	319	732	0	0,87	2,00	0,00	2,87
2014	56 298	499	662	6	0,89	1,18	0,01	2,07
2015		173	543	4				
2016	58 130	131	395	57	0,23	0,68	0,10	1,00
2017	34 110	280	641	19	0,82	1,88	0,06	2,76
2018	38 049	189	775	0	0,50	2,04	0,00	2,53
2019	36 808	523	682		1,42	1,85		
2020	37 910	459			1,21			
2021	60 505							
Moyenne					0,49	0,96	0,02	1,43
Moyenne 1992-2020					0,49	0,91	0,02	1,37

Estimations obtenues en faisant la moyenne des cinq dernières années pour lesquelles un minimum de 15 individus ont été âgés.

Tableau XVIII. Taux de retour de la mer, du smolt jusqu'à l'adulte, dans la rivière de la Trinité de 1984 à 2021

Année	<i>Rivière de la Trinité</i> ¹					
	Smolts	Mad. an + 1	Diber. an + 2	Taux de retour (%) du smolt à :		
				Mad.	Diber.	Tous
1984	67 922	1 093	1 129	1,61	1,66	3,27
1985	65 847	1 603	1 053	2,43	1,60	4,03
1986	96 316	1 352	1 243	1,40	1,29	2,69
1987	77 342	1 696	943	2,19	1,22	3,41
1988	51 590	1 892	882	3,67	1,71	5,38
1989	79 710	2 049	1 595	2,57	2,00	4,57
1990	50 109	1 349	1 165	2,69	2,32	5,02
1991	40 696	633	238	1,56	0,58	2,14
1992	50 664	410	253	0,81	0,50	1,31
1993	85 961	579	621	0,67	0,72	1,40
1994	55 769	348	379	0,62	0,68	1,30
1995	71 679	661	362	0,92	0,50	1,43
1996	60 899	394	331	0,65	0,54	1,19
1997	31 659	524	339	1,66	1,07	2,72
1998	28 725	396	215	1,38	0,75	2,13
1999	56 056	250	138	0,45	0,25	0,69
2000	39 510	100	49	0,25	0,12	0,38
2001	70 146	404	176	0,58	0,25	0,83
2002	44 120	385	202	0,87	0,46	1,33
2003	52 737	334	97	0,63	0,18	0,82
2004	27 048	277	183	1,02	0,68	1,70
2005	34 620	515	171	1,49	0,49	1,98
2006		601	213			
2007	42 717	628	144	1,47	0,34	1,81
2008	34 812	229	169	0,66	0,49	1,14
2009	32 432	611	247	1,88	0,76	2,65
2010	37 290	949	230	2,54	0,62	3,16
2011	44 192	263	148	0,60	0,34	0,93
2012	44 896	172	40	0,38	0,09	0,47
2013	42 154	235	110	0,56	0,26	0,82
2014	30 583	571	196	1,87	0,64	2,51
2015	47 414	578	192	1,22	0,40	1,62
2016	42 059	212	71	0,50	0,17	0,67
2017	27 278	184	78	0,67	0,29	0,96
2018	35 364	150	101	0,42	0,28	0,71
2019	28 028	225	82	0,80	0,29	1,09
2020	38 741	770		1,99		
2021	42 487					
Moyenne				1,30	0,79	2,07
Moyenne 1992-2020				0,92	0,44	1,33

¹Y compris la pêche commerciale.

Figures




Figure 1. La rivière Saint-Jean dans son contexte géographique




Figure 2. La rivière de la Trinité dans son contexte géographique






Figure 3. Précipitations et température journalière de l'eau des rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021




Comparaison entre la température moyenne journalière de l'eau et la capture des smolts




Pourcentage de smolts capturés chaque jour

Figure 4. Évolution de la dévalaison des smolts dans la rivière Saint-Jean en 2021



Comparaison entre la température moyenne journalière de l'eau et la capture des smolts

Nombre de captures quotidiennes



Pourcentage de smolts capturés chaque jour

Figure 5. Évolution de la dévalaison des smolts dans la rivière de la Trinité en 2021




Figure 6. Comparaison de la longueur totale moyenne journalière des smolts des rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021





Figure 7. Classes de longueur des smolts mesurés vivants et intervalles de classes de longueur en fonction de l'âge des smolts échantillonnés dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021




Figure 8. Abondance des madeleineaux et des rédiBERmarins dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité de 1984 à 2021




Figure 9. Nombre d'ombles de fontaine anadromes en montaison enregistrés annuellement à la passe migratoire, présenté par classes de taille, dans la rivière de la Trinité de 1985 à 2021




Figure 10. Nombre d'ombles chevaliers anadromes en montaison enregistrés annuellement à la passe migratoire de la rivière de la Trinité de 1999 à 2021




Figure 11. Nombre d'ombles de fontaine et d'ombles chevaliers en montaison enregistrés quotidiennement à la passe migratoire de la rivière de la Trinité en 2021




Figure 12. Classes de longueur et intervalles de classes de longueur en fonction de l'âge des saumons adultes échantillonnés dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité en 2021




Figure 13. Poids moyen des saumons des rivières Saint-Jean et de la Trinité de 1983 à 2021




Figure 14. Longueur à la fourche moyenne des saumons des rivières Saint-Jean et de la Trinité de 1983 à 2021




Figure 15. Taux de survie en rivière, de l'œuf au smolt, dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité





Figure 16. Taux de retour de la mer, du smolt à l'adulte, dans les rivières Saint-Jean et de la Trinité.



**Forêts, Faune
et Parcs**

Québec 