

---

# Forêt ancienne du Lac-Larry

Pessière noire à sapin et sapinière à épinette noire

## Écosystème forestier exceptionnel de la région de la Côte-Nord

### EN QUOI CET ÉCOSYSTÈME EST-IL EXCEPTIONNEL ?

La forêt ancienne du Lac-Larry est principalement formée de pessières à épinette noire et à sapin et de sapinières à épinette noire qui ont plus de 200 ans. Cette forêt n'a pas été sérieusement affectée par les feux, les épidémies d'insectes et, surtout, les chablis, ce qui est exceptionnel pour une aussi vieille forêt résineuse. De plus, elle est composée de peuplements qui n'ont jamais été aménagés ou perturbés par les activités humaines. Certaines conditions particulières au site du lac Larry, comme sa configuration, sa topographie accidentée et la nature du sol, ont permis à cette forêt ancienne d'évoluer différemment de la plupart des pessières et sapinières de la région. Ainsi, elle a pu évoluer naturellement et développer d'autres caractéristiques propres aux forêts anciennes, dont une structure d'âge irrégulière, l'abondance du sapin baumier, la présence d'arbres sénescents et de nombreux chicots et débris atteignant la taille des plus gros arbres. Cette forêt se renouvelle grâce à des trouées créées dans le couvert par de petits renversements, sans que ceux-ci atteignent des proportions trop importantes comme c'est le cas dans les massifs forestiers avoisinants. Cette dynamique agit probablement depuis bien plus longtemps que l'âge maximal de la majorité des arbres qui vivent actuellement dans la forêt. La plupart des arbres dominants dépassent 200 ans, et les plus vieux ont environ 250 ans. Même s'ils sont âgés, les arbres conservent des dimensions relativement modestes en raison des conditions bioclimatiques. Très peu de tiges dépassent 30 cm de diamètre et 20 m de hauteur. Par contre, l'épinette blanche peut atteindre 40 cm de diamètre et 30 m de hauteur.

### PORTRAIT SOMMAIRE DE LA FORÊT ANCIENNE DU LAC-LARRY


Cette forêt ancienne fait partie du sous-domaine bioclimatique de la pessière à mousses de l'Est. Elle s'étend de façon continue sur 842 ha à quelque

45 km au nord-ouest de Port-Cartier. Cette région est caractérisée par un relief de hautes collines aux sommets aplatés. La forêt ancienne occupe, sur des versants en pente moyenne ou forte, des stations mésiques recouvertes de till mince.

La forêt ancienne du Lac-Larry renferme aussi une pessière à sphaignes, qui colonise les stations hydriques, ainsi qu'une sapinière à épinette blanche, qui apparaît sur les sites mésiques les plus riches, souvent au bas des pentes, le long des nombreux ruisseaux qui sillonnent le site. Dans la forêt, sapin et épinette noire sont aussi présents en sous-étage.


Les plantes et les arbustes du sous-bois sont peu diversifiés. On note surtout des mousses hypnacées et des plantes latifoliées communes en zone boréale comme *Cornus canadensis* et *Linnaea borealis*.

L'amélanchier est présent, mais ne représente qu'une faible proportion du couvert végétal.



▲ Forêt ancienne du Lac-Larry





### POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
 Direction de l'environnement forestier  
 880, chemin Sainte-Foy, 5<sup>e</sup> étage  
 Québec (Québec) G1S 4X4  
 Téléphone : (418) 627-8646  
 Télécopieur : (418) 643-5651  
 Courriel : def@mrrnf.gouv.qc.ca  
 Site Internet : www.mrrnf.gouv.qc.ca  
 N° publication : DEF-204 F-78

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
 Forêt Québec  
 Direction régionale de la Côte-Nord  
 625, boulevard Lafleche, RC, bur. 702  
 Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5  
 Téléphone : (418) 295-4676  
 Télécopieur : (418) 295-4682  
 Courriel : cote-nord.forets@mrrnf.gouv.qc.ca

Dossier n° 863

Ce document est disponible dans Internet à l'adresse suivante : [www.mrrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosystemes.jsp](http://www.mrrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosystemes.jsp)