

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DE LA FLORE
VASCULAIRE DU TERRITOIRE DE PROJET DE PARC
NATASHQUAN -AGUANUS-KENAMU, BASSE-CÔTE-NORD,
QUÉBEC

Norman Dignard



Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
Direction de la recherche forestière
Herbier du Québec
2004

Québec 

**CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DE LA FLORE
VASCULAIRE DU TERRITOIRE DU PROJET DE PARC
NATASHQUAN-AGUANUS-KENAMU, CÔTE-NORD, QUÉBEC**

Norman Dignard

**Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
Direction de la recherche forestière**

**Rapport préparé pour la
Direction des parcs
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
2004**

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES.....	i
LISTE DES TABLEAUX.....	ii
LISTE DES FIGURES.....	iii
INTRODUCTION.....	1
1. CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE ÉTUDIÉ	2
1.1 Localisation et superficie	2
1.2 Climat régional	2
1.3 Géologie, relief, hydrographie et dépôts de surface	4
1.4 Occupation et utilisation du territoire	4
2. MÉTHODES	6
3. RÉSULTATS	13
3.1 Liste annotée des espèces vasculaires	13
3.2 Analyse de la flore vasculaire	54
3.2.1 Répartition des taxons par famille	54
3.2.2 Spectre phytogéographique de la flore vasculaire	55
3.2.3 Additions et extensions d'aire de répartition	55
3.2.4 Taxons rares à l'échelle du territoire étudié	58
3.2.5 Taxons arctiques-alpins	58
3.2.6 Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec	59
3.3 Principaux secteurs d'intérêt identifiés sur le territoire	60
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	63
REMERCIEMENTS	64
RÉFÉRENCES	65
ANNEXES	68
Annexe 1 Liste alphabétique des taxons de la flore vasculaire du territoire du projet de parc Natashquan-Aguanus-Kenamu	69
Annexe 2 Photographies	72

Liste des tableaux

Tableau 1	Localisation et caractéristiques des sites d'échantillonnage	7
Tableau 2	Spectre phytogéographique de la flore vasculaire du territoire du projet de parc de Natashquan-Aguanus-Kenamu	56
Tableau 3	Taxons atteignant sur le territoire leur limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador	57
Tableau 4	Éléments remarquables des sites d'intérêt identifiés pour la flore vasculaire	61

Liste des figures

Figure 1	Localisation du territoire étudié et des sites d'échantillonnage	3
Figure 2	<i>Hudsonia tomentosa</i>	59
Figure 3	Répartition de <i>Hudsonia tomentosa</i> au Québec	59
Figure 4	Sites d'échantillonnage comportant des éléments floristiques d'intérêt et habitats potentiels d'espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables	62

Introduction

En 1992, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche déposait son Plan d'action sur les parcs dans lequel étaient présentés dix-huit territoires, situés au nord du 50^e parallèle, désignés « territoires réservés aux fins de création de parcs ». La présente étude s'inscrit dans la foulée de la mise en œuvre de ce plan d'action. Elle porte sur l'inventaire et l'analyse de la flore vasculaire du projet de parc de Natashquan-Agwanus-Kenamu, s'attardant à établir sa représentativité et ses éléments exceptionnels ou fragiles.

En vue de rencontrer ces objectifs, une première campagne de terrain s'est déroulée, principalement dans le secteur de la rivière Natashquan, à l'été 2002. Les inventaires se sont poursuivis en septembre 2003, couvrant cette fois tout le territoire à l'étude. On trouvera dans ce rapport la liste annotée des plantes vasculaires, l'analyse de la flore ainsi que des recommandations quant au périmètre du parc de Natashquan-Agwanus-Kenamu, à la conservation de la flore et à l'acquisition des données complémentaires.

1. Caractéristiques du territoire étudié

1.1 Localisation et superficie

Le projet de parc Natashquan-Agvanus-Kénamu vise à représenter deux régions naturelles du Québec, soit celle des Laurentides boréales (B-17) et celle du Plateau du Petit Mécatina (B-16) (MLCP, 1986). À cet effet, le territoire analysé en vue de circonscrire le périmètre du parc est situé à la jonction des deux régions naturelles et couvre une superficie totale de 16 270 km². Il est borné à l'ouest et à l'est par les limites de sous-bassins hydrographiques des rivières Natashquan et du Petit-Mécatina. Au nord, il s'adosse à la frontière entre le Québec et le Labrador, selon le tracé de 1927 du Conseil privé. La limite sud passe à la lisière de plusieurs bassins versants et serpente d'ouest en est entre les lacs Le Doré (sud), Bohier (nord), Nyel (sud), Montcevelles (nord) ainsi que les lacs Cobaz et Briçonnet (sud). Grossièrement, ces limites correspondent aux longitudes 59°40'O, pour l'est et un axe nord-ouest-sud-est débutant au 62°30'O, et se terminant au 61°30'O, pour l'ouest. La limite nord longe le 52°N, de latitude et celle du sud le 51°15'N, de latitude pour le plateau et le 50°40'N, de latitude pour la limite sud du bassin de la Natashquan (figure 1). Il est à noter que le grand ensemble ainsi défini comprend à la fois les terres réservées à la carte d'affectation des terres publiques pour le projet de parc Agvanus-Kénamu depuis 1992, l'aire protégée de la Vallée de la rivière Natashquan qui a enrichi ce projet initial à compter de 2002, ainsi que des superficies additionnelles à la marge de ces deux entités. Ces dernières ont été incluses tout récemment au territoire à l'étude afin de tenir compte, au moment de l'analyse, de facteurs tels la localisation des sous-bassins hydrographiques et la protection visuelle des corridors des vallées.

1.2 Climat régional

Le climat de la partie nord du territoire à l'étude est de type subpolaire subhumide continental alors que la partie sud est de même type mais de continentalité intermédiaire (Proulx *et al.* 1987). La différence tient au fait que la température moyenne annuelle est légèrement plus fraîche au nord et que l'insolation est sensiblement plus élevée au sud. La température annuelle moyenne varie entre 0°C et -3°C, avec une moyenne des maxima et des minima respectivement de 3,5°C à 2°C au sud et de -4°C à -8°C au nord. Les précipitations sont de l'ordre de 1 100 à 1 200 mm par année. La fraction nivale est de 50% à Churchill Falls et à Goose Bay, alors qu'elle n'est que de 30% vers Natashquan et Tête-à-la-Baleine. Ceci se répercute aussi sur le nombre de journées avec une couverture de neige supérieure à 1 cm. À Natashquan et Tête-à-la-Baleine, il est d'environ


Figure 1

Localisation du territoire étudié et des sites d'échantillonnage

- Numéro de site d'échantillonnage
- Projet d'aire protégée de la rivière Natashquan
- Projet de parc Aguanus-Kenamu



Ressources naturelles, Faune et Parcs Québec



150 jours tandis qu'il est supérieur à 200 pour Wabush et Churchill Falls. La durée de la saison de croissance se situe entre 1 200 et 1 600 degrés-jours et la longueur de la saison sans gel entre 100 et 120 jours (Houde, 1978; Wilson, 1971).

1.3 Géologie, relief, hydrographie et dépôts de surface

Les événements qui ont conduit à l'édification de la province tectonique de Grenville durèrent près d'un milliard d'années. Au cours du Mésozoïque, le climat favorise l'érosion fluviale et la formation des vallées en suivant la structure de base acquise au Précambrien, ce qui conduisit au morcellement d'un plateau profondément disséqué. Au cours du Cénozoïque, les températures moyennes annuelles diminuèrent significativement et le refroidissement climatique provoqua la formation d'immenses calottes de glace sur le continent au Quaternaire.

Les glaciers du Wisconsinien ont rajeuni les surfaces, remodelé les vallées et déposé des volumes considérables de matériaux meubles, entre autres, la moraine frontale de la Côte-Nord qui traverse tout le territoire. La mise en place des dépôts meubles a partiellement comblé les dépressions et a superficiellement dérangé la configuration du réseau hydrographique. L'invasion marine postglaciaire dans la partie aval des vallées des rivières Natashquan et du Petit Mécatina y a aussi laissé des dépôts argileux.

L'action des phénomènes gravitaires et d'écoulement fluvial et, dans une moindre mesure, du vent et des processus périglaciaires contribuent encore à l'évolution du paysage. Les événements du Wisconsinien et de l'Holocène ont laissé des dépôts meubles sur les surfaces d'érosion précambriennes, ce qui correspond à une discordance majeure de l'ordre d'un milliard d'années entre les formations géologiques (Baron-Lafrenière, 2003).

1.4 Occupation et utilisation du territoire

Le territoire à l'étude est constitué de terres publiques dont la gestion relève du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Il y intervient aussi en vertu de ses responsabilités en matière d'aménagement et d'exploitation des ressources fauniques. Une entente intervenue en 1999 entre la Société de la faune et des parcs du Québec et le Conseil montagnais de Natashquan en vue de faciliter le développement et la gestion des ressources fauniques accorde aussi aux Montagnais de Natashquan les droits exclusifs de pêche au saumon le long du cours principal de la rivière Natashquan. Deux autres secteurs ont par la suite été confiés à la gestion du Conseil

montagnais leur accordant des droits exclusifs de chasse et de pêche : le premier se situe au nord de la rivière Natashquan et le second au voisinage du lac Le Doré,

Le territoire à l'étude a conservé son caractère sauvage. Ne s'y trouvent, disséminés ça et là, que quelques camps de chasse et de pêche ainsi que des carrés de tente, pour la plupart détenus par les Innus de Natashquan et de La Romaine. Une piste d'atterrissage en terre battue, construite par Hydro-Québec au cours des années 1970 lors de la réalisation des relevés des rivières, se situe du côté est de la rivière du Petit Mécatina, au niveau du lac Briçonnet. Pour le reste, l'accès au territoire se fait par hydravion ou en embarcation motorisée.

2. Méthodes

L'inventaire du territoire à l'étude s'est déroulé sur deux saisons. En 2002, la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) a échantillonné un premier secteur correspondant au projet d'aire protégée de la vallée de la rivière Natashquan afin d'évaluer l'intérêt d'inclure cette entité au projet de parc Aguanus-Kenamu qui lui était contiguë. Une reconnaissance en canot à moteur a été effectuée du 12 au 16 août 2002, par Annie Maloney, Nathalie Girard et Alain Hébert accompagnés des membres de la famille Whapistan de la réserve indienne de Natashquan. Elle fut suivie de relevés effectués du 19 au 22 août 2002 par Marcel Blondeau, Annie Maloney (plantes vasculaires) et Jean Gagnon (plantes invasculaires). Les déplacements ont alors été effectués par hélicoptère.

En 2003, des relevés destinés à caractériser les grandes unités végétales du territoire à l'étude et à poursuivre l'inventaire de la flore vasculaire ont été réalisés par Annie Maloney de la FAPAQ et Norman Dignard du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (Maloney *et al.*, 2002; Blondeau *et al.*, 2003). L'ensemble du territoire à l'étude a alors été couvert. Les déplacements ont été effectués en hélicoptère, à partir de Natashquan pour la partie ouest et de Harrington Harbour pour la partie est. La flore invasculaire n'a pas fait l'objet d'inventaire en 2003. Au total, 45 sites ont fait l'objet de relevés en 2002 et 2003 (tableau 1). Les récoltes de bryophytes et de lichens ne sont pas indiquées au tableau.

Tableau 1 Localisation et caractéristiques des sites d'échantillonnage (sites 1 à 20 échantillonnés en 2002, sites 21 à 46 échantillonnés en 2003)

1. Rivière Natashquan, 15,7 km au sud de l'embouchure de la rivière Akaku, 50°40'41,2"N.-61°40'07,7"O., alt. 70 m. Dépôts organique et marin. 16 août 2002. 3 récoltes numérotées *Maloney, Girard & Hébert 97 à 99*.
2. Rivière Natashquan, 12,7 km en aval de la rivière Akaku, 50°42'34,7"N.-61°39'03,0"O., alt. 50 m. Dépôt fluviatile. 12 août 2002. 15 récoltes numérotées *Maloney, Girard & Hébert 1, 2, 23 à 35*.
3. Rivière Natashquan, 9,3 km au sud de l'embouchure de la rivière Akaku, 50°43'59,0"N.-61°37'14,1"O., alt. 50 m. Dépôt marin. 16 août 2002. 4 récoltes numérotées *Maloney, Girard & Hébert 94 à 96*.
4. Rivière Natashquan, 3 km au nord de l'embouchure de la rivière Akaku, 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., alt. 65 m. Dépôt fluviatile. 12 août 2002. 21 récoltes numérotées *Maloney, Girard & Hébert 3 à 19, 22 et 90 à 92*.
5. Rivière Natashquan, à la hauteur de l'embouchure de la rivière Natashquan-Ouest, 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., alt. 85 m. Dépôt fluviatile. 13 août 2002. 18 récoltes numérotées *Maloney, Girard & Hébert 43 à 48, 52, 53, 56 à 59, 61 à 66*.
6. Rivière Natashquan, portage Nihuahtehitih, 11,2 km au nord de l'embouchure de la rivière Natashquan-Ouest, 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O. à 50°57'57,4"N.-61°36'28,9"O., alt. 85-120 m. Dépôt fluviatile. 13 août 2002. 22 récoltes numérotées *Maloney, Girard & Hébert 37, 38, 41, 42, 49 à 51, 67, 72 à 82, 84, 88, 89*.
7. Rivière Natashquan, 13,6 km au nord de l'embouchure de la rivière Natashquan-Ouest, 51°04'06,9"N.-61°32'01,6"O., alt. 120 m. Dépôt juxtaglaciaire. 13 août 2002. 2 récoltes numérotées *Maloney, Girard & Hébert 21, 36*.
8. Rivière Natashquan, 11,4 km au sud de l'embouchure de la rivière Natashquan-Est (camp Whapistan), 51°14'45,0"N.-61°43'57,0"O., alt. 175 m. Dépôt fluviatile. 15 août 2002. 2 récoltes numérotées *Maloney, Girard et Hébert 39, 40*.
9. Rivière Natashquan, 5,8 km au sud de l'embouchure de la rivière Akaku, 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O. à 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., alt. 58 m. Plage de sable sur dépôt fluviatile. 21 août 2002. 34 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-51 à NAT02-67, NAT02-69 à NAT02-83, NAT02-116, NAT02-133*.
10. Rivière Natashquan, 5,3 km au nord de l'embouchure de la rivière Natashquan-Ouest, 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., alt. 67 m. Plage de sable et peupleraie baumière sur dépôt fluviatile. 21-22 août 2002. 14 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-110, NAT02-120 à NAT02-132*.
11. Rivière Natashquan, sommet du côté ouest de la rivière, à la hauteur de la décharge du lac Poulet, 51°03'29,2"N.-61°33'21,1"O. à 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., alt. 165 m. Bétulaie blanche à résineux, pessière noire, dénudé, semi-dénudé sec, semi-dénudé humide sur till et

épandage, 22 août 2002, 15 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-68, NAT02-104 à NAT02-109, NAT02-111 à NAT02-114, NAT02-117 à NAT02-119*.

12. Rivière Natashquan, 14,6 km au sud de l'embouchure de la rivière Natashquan-Est, 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., alt. 159 m. Dénudé et semi-dénudé sec, matériel organique sur dépôt éolien, 20 août 2002, 4 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-47 à NAT02-50*.
13. Rivière Le Doré, 1,3 km au sud du lac Le Doré, 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O. à 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., alt. 163 m. Dénudé et semi-dénudé humide sur matériel organique, Pessière à épinette sur till, 22 août 2002, 7 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-97 à NAT02-103*.
14. Rivière Natashquan, 4,6 km au sud de l'embouchure de la rivière Natashquan-Est, 51°18'18,8"N.-61°41'44,4"O. à 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., alt. 130 m. Aulnaie et pessière à épinette sur épandage, 21 août 2002, 13 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-84 à NAT02-96*.
15. Rivière Natashquan-Est, 8,5 km au nord de l'embouchure de la rivière Natashquan, 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., alt. 117 m. Plage et pessière à sapin sur dépôt fluvial, 20 août 2002, 18 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-27 à NAT02-44*.
16. Sommet entre les rivières Natashquan et Natashquan-Est, 9,5 km au nord de l'embouchure de la rivière Natashquan-Est, 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., alt. 547 m. Dénudé et semi-dénudé sec sur roc, 20 août 2002, 2 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-45 et NAT02-46*.
17. Rivière Natashquan, 1,6 km au nord de l'embouchure de la rivière Mistanipisipou, 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., alt. 144 m. Plage et sapinière à épinette sur dépôt fluvial, 19 août 2002, 7 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-5 à NAT02-12*.
18. Sommet entre les rivières Natashquan et Mahkuniapiu, 3,8 km au nord de leur confluence, 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., alt. 547 m. Dénudé et semi-dénudé sec sur till mince, 19 août 2002, 4 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-1 à NAT02-4*.
19. Affluent de la rivière Olomane, 2,8 km au sud-sud-ouest des Petits lacs Mantupeukus, 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., alt. 396 m. Aulnaie et pessière à épinette sur épandage, 20 août 2002, 14 récoltes numérotées *Blondeau & Maloney NAT02-13 à NAT02-26*.
20. Sommet situé à environ 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., alt. 425 m. Rochers secs du sommet et escarpements, 8 septembre 2003, 16 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-410 à 03-421*.
21. Rive est et île de la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., alt. 65 m. Alluvions récentes et terrasse fluvioglaciale, 8 septembre 2003, 14 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-422 à 03-435*.
22. Rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier, 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., alt. 100 m. Terrasse alluviale, 9 septembre 2003, 11 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-436 à 03-446*.

23. Rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., alt. 480 m, Tourbière, 9 septembre 2003, 21 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-447 à 03-467*.
24. Rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., alt. 400 m, Complexe fluvioglaciaire, 9 septembre 2003, 5 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-468 à 03-472*.
25. Sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., alt. 550 m, Rochers et till mince, 9 septembre 2003, 9 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-473 à 03-481*.
26. Île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu, 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., alt. 180 m, Terrasse fluvioglaciaire, 9 septembre 2003, 3 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-482 à 03-484*.
27. Sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué, 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., alt. 610 m, Rochers et till mince, 9 septembre 2003, 7 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-485 à 03-491*.
28. Côté ouest du lac Fonteneau, 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., alt. 425 m, Complexe fluvioglaciaire, 10 septembre 2003, 3 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-492 à 03-494*.
29. Environ 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., alt. 550 m, Tourbière, 10 septembre 2003, 20 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-495 à 03-512b*.
30. Un (1) km au sud du lac Umuaku, 51°54'57,7"N.-61°15'43,2"O., alt. 490 m, Tourbière, 10 septembre 2003, Une récolte numérotée *Dignard & Maloney 03-513*.
31. Cinq (5) km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., alt. 425 m, Prairie riveraine, 11 septembre 2003, 19 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-514 à 03-531*.
32. Bord de la rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., alt. 365 m, Tourbière et alluvions, 11 septembre 2003, 19 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-532 à 03-544*.
33. Bord de la rivière Olomane, 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., alt. 425 m, Alluvions, 11 septembre 2003, 15 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-545 à 03-561*.
34. Lac Le Doré, rive ouest, 51°15'45,0"N.-61°23'35,0"O., alt. 305 m, Alluvions, 11 septembre 2003, Une récolte numérotée *Dignard & Maloney 03-562*.
35. Rive est de la rivière du Petit Mécatina, 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., alt. 250 m, Sables de l'ancienne piste d'atterrissage, 13 septembre 2003, 9 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-563 à 03-570*.

36. 2 km au sud du lac Chenil, 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., alt. 295 m. Tourbière. 13 septembre 2003. Une récolte numérotée *Dignard & Maloney 03-571*.
37. Rive ouest du lac Kahakauamat, 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., alt. 290 m. Alluvions et dépôts lacustres. 13 septembre 2003. 3 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-572 à 03-574*.
38. Rive est de la rivière du Petit Mécatina, 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., alt. 135 m. Rochers et alluvions. 15 septembre 2003. 22 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-575 à 03-601*.
39. Côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi, 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., alt. 240 m. Tourbière riveraine. 15 septembre 2003. 18 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-602 à 03-619*.
40. Petit lac situé à 7,5 km au sud du lac Cobaz, 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., alt. 335 m. Tourbière riveraine. 15 septembre 2003. 11 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-620 à 03-630*.
41. Gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., alt. 450 m. Rochers et till mince. 16 septembre 2003. 18 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-631 à 03-649a*.
42. Île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux, 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., alt. 250 m. Terrasse fluvioglaciale. 16 septembre 2003. 4 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-650 à 03-652*.
43. Montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, haut versant, 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., alt. 365 m. Till mince. 16 septembre 2003. Aucune récolte.
44. Côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, à l'est de la piste d'atterrissage, 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., alt. 275 m. Champ de dunes. 16 septembre 2003. 3 récoltes numérotées *Dignard & Maloney 03-654 à 03-656*.
45. Côté est de la rivière du Petit Mécatina, 5,8 km au sud du lac Hakluyt, 51°35'07,2"N.-59°59'25,4"O., alt. 280 m. Champ de dunes. 16 septembre 2003. Une récolte numérotée *Dignard & Maloney 03-657*.

Les spécimens de plantes vasculaires récoltés en 2002 sont conservés à l'Herbier Louis-Marie de l'Université Laval (QFA¹). Les spécimens récoltés en 2003 sont conservés à l'Herbier du Québec du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (QUE). Les flores bryologique et lichénique feront éventuellement l'objet d'un rapport autonome. La liste annotée des plantes vasculaires intègre les récoltes et les observations réalisées au cours des inventaires de 2002 et de 2003. Elle comprend également les taxons signalés par Lavoie (1984) ou saisis dans la banque de données de l'inventaire du Capital-Nature de la Direction du patrimoine écologique et du développement durable du ministère de l'Environnement du Québec. Les récoltes de 2002 ont été déterminées par Marcel Blondeau, celles de 2003 par Norman Dignard. Les principaux ouvrages utilisés pour déterminer le matériel sont ceux de Fernald (1950), Scoggan (1978-1979), Porsild et Cody (1980), Cody (1996) et Hultén (1968) et les volumes publiés de la série *Flora of North America* (FNAEC 1993, 1997, 2000, 2002, 2002a, 2003). La nomenclature des plantes vasculaires suit généralement celle de Kartesz et Meacham (1999) ou des sites internet de *Flora of North America* (2002) et *USDA/NRCS* (2002). Le type d'aire de répartition des taxons, tel que formulé par Payette et Lepage (1977), a été déterminé à partir des travaux de Hultén (1968), de Rousseau (1974), de Scoggan (1978-79), de Porsild et Cody (1980), du FNAEC (1993, 1997, 2000, 2002, 2002a, 2003) et de Cody (1996). La liste annotée présente, dans l'ordre, le nom du taxon, regroupé par famille selon l'ordre taxonomique proposé par Scoggan (1978-1979), le(s) synonyme(s) si besoin, le type d'aire de répartition, des données sommaires sur les types d'habitat fréquentés, un indice de fréquence basé nécessairement sur les données disponibles sur la flore du territoire, la localisation des sites de récolte, la date de récolte, les noms des récolteurs et le numéro des récoltes en italique (à l'exception des récoltes de l'inventaire du Capital-Nature dont les données apparaissent dans Lavoie (1984)). Les taxons notés dans les relevés ou les listes floristiques mais non récoltés apparaissent aussi dans la liste annotée (par ex. Blondeau & Maloney obs.).

Les types d'aire de répartition et l'affinité bioclimatique des taxons se définissent comme suit :

- Amphi-atlantique : taxon dont l'aire de répartition occupe les deux côtés de l'Atlantique et n'atteint pas le Pacifique.
- Arctique-alpin : taxon dont l'aire de répartition est principalement centrée en milieu arctique et alpin, au nord de la limite écologique des forêts en latitude et au-delà de la limite écologique des forêts en altitude.
- Asiatique : taxon dont l'aire de répartition comprend le continent asiatique.
- Boréal : taxon dont l'aire de répartition est principalement centrée en milieu boréal, correspondant à la zone de la forêt coniférienne boréale.

¹ Les acronymes des herbiers sont ceux utilisés par Holmgren *et al.*, (1990).

- Circumboréal : taxon dont l'aire de répartition est principalement centrée en milieu boréal dans tout l'hémisphère nord.
- Circumpolaire : taxon dont l'aire de répartition est principalement centrée en milieu arctique dans tout l'hémisphère nord.
- Circumtempéré : taxon dont l'aire de répartition est principalement centrée en milieu tempéré dans tout l'hémisphère nord.
- Cordillérien : taxon dont l'aire de répartition est principalement centrée dans le nord-ouest américain, au niveau de la Cordillère américaine.
- Cosmopolite : taxon dont l'aire de répartition occupe plusieurs zones climatiques, de l'Arctique au milieu tempéré ou du Boréal au milieu tropical tout au moins, sur l'ensemble du globe.
- Est-asiatique : taxon dont l'aire de répartition comprend la partie orientale du continent asiatique.
- Nord-américain : taxon dont l'aire de répartition est limitée au continent nord-américain, y compris le Groenland et l'archipel arctique.
- Nord-est américain : taxon dont l'aire de répartition est principalement centré à l'est du 100° de longitude ouest.
- Tempéré : taxon dont l'aire de répartition est principalement centrée en milieu tempéré, correspondant à la zone de la forêt feuillue.

3. Résultats

3.1 Liste annotée de la flore vasculaire

La compilation des données issues des inventaires de 2002 (Blondeau *et al.*, 2003) et de 2003 ainsi que les récoltes ou observations antérieures rapportées par Lavoie (1984) ou contenues dans la banque de données de l'inventaire du Capital-Nature de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord permettent d'évaluer la flore vasculaire du territoire à au moins 241 taxons. Cinquante-sept taxons sont ainsi ajoutés à la liste de Blondeau *et al.* (2003) et 22 à la liste de Lavoie (1984). Au total, 507 spécimens sont cités dans la liste annotée, soit les 52 spécimens récoltés lors de l'inventaire du Capital-Nature, les 216 spécimens récoltés en 2002 et les 239 spécimens récoltés en 2003. La liste comprend aussi 627 observations, soit 5 réalisées par l'équipe de l'inventaire du Capital-Nature entre 1978 et 1981, 261 réalisées en 2002 et 361 en 2003.

Ptérédophytes

Equisetaceae

Equisetum fluviatile L. — Circumboréal — Mares de tourbières. Peu fréquent — 51°54'57,7"N.-61°15'43,2"O., 1 km au sud du lac Umuaku. *Dignard & Maloney 03-513*; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. *Dignard & Maloney obs.*

Equisetum palustre L. — Circumboréal — Alluvions. Rare — 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., rive est de la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. *Dignard & Maloney 03-431*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Cartographiée pour la région par Hauke (1993).

Equisetum scirpoides Michx. — Circumboréal — Sous-bois. Rare — 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., rive est de la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. *Dignard & Maloney 03-431*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Selon Hauke (1993), elle atteindrait sa limite québécoise vers le nord-est dans la région.

Equisetum sylvaticum L. — Circumboréal — Rivages, alluvions, sous-bois, arbustives. Peu fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan, près de la sixième chute. *Maloney. Girard & Hébert 84*; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O. *Blondeau & Maloney NAT02-112*; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., *Blondeau & Maloney obs.*; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. *Dignard & Maloney obs.*; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. *Dignard & Maloney obs.*; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. *Dignard & Maloney 03-527*; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac

Kahakaukamat, Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

Lycopodiaceae

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [= *Lycopodium complanatum* L.] — Circumboréal — Sous-bois, arbustaies. Peu fréquent — 51°49'N.-61°52'O., env. 27 km à l'ouest du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney 03-419; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. Dignard & Maloney 03-484.

Diphasiastrum xabinifolium (Willd.) Holub (*D. sitchense* (Rupr.) Holub × *D. tristachyum* (Pursh) Holub) [= *Lycopodium sabinifolium* Willd.] — Boréal nord-américain et asiatique — Sables secs, rochers. Assez fréquent — 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney NAT02-46 (? sub *D. sitchense* (Rupr.) Holub); 51°49'N.-61°52'O., env. 27 km à l'ouest du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier. Dignard & Maloney 03-442; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney 03-471; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-649, 03-649a; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt. Dignard & Maloney obs.

Huperzia lucidula (Michx.) Trevisan [= *Lycopodium lucidulum* Michx.] — Tempéré nord-est américain — Sous-bois. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., bord de la rivière Natashquan. Maloney, Girard & Hébert 53.

Huperzia selago Bernh. ex Mart. & Schrank s.l. [= *Lycopodium selago* L.] — Circumboréal — Sols détritiques et rochers des hauts sommets. Peu fréquent — 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney 03-417; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-635.

Lycopodium annotinum L. [= *Spinulum annotinum* ((L.) A. Haines; incl. var. *pungens* La Pylaie ex Desv. et *Spinulum canadense* (Ness.) A. Haines)] — Circumboréal — Sous-bois, rochers et sols minces des hauts sommets. Assez fréquent — 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-130; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdellhué. Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. Dignard & Maloney obs.; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdellhué. Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-639; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km

en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux, Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

***Lycopodium clavatum* L. s.l.** — Circumboréal — Sous-bois. Peu fréquent — 51°30'N.-60°30'O., lac Kahakauamat (banque de données MENV).

Il s'agit probablement de *L. lagopus* (Laestad. ex C. Hartm.) G. Zinserling ex Kuzeneva Prochorova (= *L. clavatum* var. *monostachyon* Hooker & Greville).

***Lycopodium dendroideum* Michx.** [= *L. obscurum* var. *dendroideum* (Michx.) D.C. Eat.; *Dendrolycopodium dendroideum* (Michx.) A. Haines] — Boréal nord-américain et asiatique — Sous-bois. Peu fréquent — 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., bord de la rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 57; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-131; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu, Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

Isoetaceae

***Isoetes echinospora* Durieu** — Circumboréal — Eau peu profonde. Peu fréquent — 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney 03-459; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney 03-538.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Cartographiée pour la région par Taylor *et al.* (1993).

Osmundaceae

***Osmunda claytoniana* L.** — Tempéré nord-est américain — Arbustives, sous-bois, alluvions et rives. Assez fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., bord de la rivière Natashquan, près de la sixième chute. Maloney. Girard & Hébert 89; 51°15'45,0"N.-61°23'35,0"O., lac Le Doré, rive ouest. Dignard & Maloney 03-562; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat, Dignard & Maloney 03-572; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

Dennstaedtiaceae

***Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *latiusculum* (Desv.) Underwood ex Heller** — Cosmopolite — Rochers secs. Rare — 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-641.

Atteint sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (*vide* Rousseau, 1974; Cody et Britton, 1989; Fleurbaey, 1993; Meades *et al.*, 2000). Au Québec, sa limite de répartition vers le nord se situe vers le 51°26'N. (rivière Takwa, lac Mistassini) (Rousseau, 1974).

Thelypteridaceae

***Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt** [= *Dryopteris phegopteris* (L.) C. Christens.] — Circumboréal — Sous-bois, arbustives, bords de ruisseaux, escarpements. Assez fréquent

— 50°45'32,2"N, -61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°53'51,4"N, -61°40'04,0"O., bord de la rivière Natashquan. *Maloney, Girard & Hébert 61*; 50°54'25,0"N, -61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°03'30,9"N, -61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-117; 51°08'50,2"N, -61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N, -60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat, Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N, -59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. *Dignard & Maloney 03-582b*.

Dryopteridaceae

Athyrium filix-femina Roth subsp. *angustum* (Willd.) Clausen [= *A. filix-femina* Roth var. *richauxii* (Spreng.) Farw.] — Circumboréal — Arbustaies riveraines, sous-bois. Peu fréquent — 50°45'32,2"N, -61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°22'32,5"N, -61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. *Dignard & Maloney 03-543*; 51°33'23,0"N, -60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat, Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N, -60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. *Dignard & Maloney obs.*

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Arctique-alpin circumpolaire — Escarpement d'un haut sommet. Rare — 51°08'50,2"N, -61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. *Dignard & Maloney 03-420*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Cartographiée pour la région par Haufler *et al.* (1993).

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs [= *D. austriaca* (Jacquin) Woytnar ex Schinz & Thellung var. *spinulosa* (O.F. Muell.) Fischer; *D. spinulosa* (O.F. Muell.) Watt] — Boréal nord-américain et asiatique — Sous-bois, bords de ruisseaux, escarpements. Assez fréquent — 50°45'32,2"N, -61°38'12,9"O., Gagnon obs.; 50°53'51,4"N, -61°40'04,0"O., bord de la rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert 62*; 51°03'30,9"N, -61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-109; 51°18'18,8"N, -61°41'44,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-92; 51°38'43,1"N, -61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-2.

Dryopteris expansa (K. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy [= *D. assimilis* S. Walker; *D. dilatata* (Hoffmann) A. Gray *pro parte*; *D. dilatata* subsp. *americana* (Fischer ex Kunze) Hult.; *D. spinulosa* (O.F. Muell.) Watt var. *dilatata* (Hoffm.) Lawson] — Circumboréal — Sous-bois, arbustaies. Peu fréquent — 50°54'25,0"N, -61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-126; 51°42'24,1"N, -61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N, -61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu, Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N, -60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. *Dignard & Maloney 03-651*.

Dryopteris fragrans (L.) Schott — Arctique-alpin circumpolaire — Talus d'éboulis. Rare — 51°03'30,9"N, -61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-111; 51°08'50,2"N, -61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. *Dignard & Maloney 03-421*.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman [= *Dryopteris disjuncta* (Ledeb.) Morton de la Flore laurentienne] — Circumboréal — Sous-bois, arbustaies, bords de ruisseaux, rochers ombragés, escarpements. Fréquent — 50°45'32,2"N, -61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney

obs.; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., bord de la rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert* 52; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., *Blondeau & Maloney NAT02-113*; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., *Blondeau & Maloney* obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu, Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat, Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux, Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

***Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro** — Circumboréal — Sous-bois, arbustives riveraines, Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Gagnon obs.; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., *Blondeau & Maloney NAT02-81*.

Atteindrait sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (*vide* Rousseau, 1974; Cody et Britton, 1989; Fleurbec, 1993; Johnson, 1993; Meades *et al.*, 2000).

***Onoclea sensibilis* L.** — Tempéré nord-est américain et est asiatique — Sous-bois, arbustives riveraines, bords de ruisseaux. Assez fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., bord de la rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert* 9; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., *Blondeau & Maloney NAT02-39*; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, *Dignard & Maloney 03-544*; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, Dignard & Maloney obs.

***Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.** — Circumboréal — Escarpements et talus d'éboulis, Rare — 50°57'24,2"N.-61°37'08,8"O., rivière Natashquan, en amont de la sixième chute, *Maloney, Girard & Hébert* 42; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., *Blondeau & Maloney NAT02-118*.

Polypodiaceae

***Polypodium virginianum* L.** — Boréal nord-américain et asiatique — Escarpements et talus d'éboulis. Rare — 50°57'24,2"N.-61°37'08,8"O., rivière Natashquan, en amont de la sixième chute, *Maloney, Girard & Hébert* 41.

Gymnospermes

Pinaceae

***Abies balsamea* (L.) P. Mill.** — Boréal nord-américain — Tills, épandages, escarpements, tourbières. Assez fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., *Blondeau & Maloney* obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., *Blondeau & Maloney* obs.; 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., bord de la rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert* 75; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., *Blondeau & Maloney* obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., *Blondeau & Maloney* obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O.,

sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.: 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.: 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.: 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu, Dignard & Maloney obs.: 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.: 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat, Dignard & Maloney obs.: 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney obs.: 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux, Dignard & Maloney obs.

Larix laricina (Du Roi) K. Koch — Boréal nord-américain — Tills, épandages, escarpements, rochers humides, tourbières, Très fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.: 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Gagnon obs.: 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney 03-411a; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney obs.: 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, Dignard & Maloney obs.: 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau, Dignard & Maloney obs.: 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney obs.: 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney obs.: 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil, Dignard & Maloney obs.: 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney obs.

Picea glauca (Moench.) Voss — Boréal nord-américain — Tills, épandages, rives, escarpements, rochers humides, Assez fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Gagnon obs.: 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.: 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., Maloney, Girard & Hébert 76; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.: 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney obs.: 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux, Dignard & Maloney obs.

Picea mariana (P. Mill.) B.S.P. — Boréal nord-américain — Tills, épandages, dépôts lacustres et fluviaux, escarpements, rochers, tourbières, dunes et sables éoliens, brûlis, Très fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.: 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Gagnon obs.: 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Gagnon obs.: 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Gagnon obs.: 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.: 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Gagnon obs.: 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.: 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.: 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.: 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney 03-465; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, Dignard & Maloney obs.: 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.: 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu, Dignard & Maloney obs.: 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.: 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté

ouest du lac Fonteneau, Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt. Dignard & Maloney obs.

Cupressaceae

Juniperus communis L. var. *depressa* Pursh — Boréal nord-américain — Fens et rochers. Rare — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney 03-496; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-638.

Taxaceae

Taxus canadensis Marsh. — Tempéré nord-est américain — Sous-bois. Rare — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.

Angiospermes monocotyles

Sparganiaceae

Sparganium emersum Rehmann [= *S. angustifolium* Michx. subsp. *emersum* (Rehmann) Brayshaw; *S. chlorocarpum* Rydb.; *S. chlorocarpum* var. *acaule* (Beeby ex Macoun) Fern.] — Circumboréal — Eaux peu profondes. Rare — 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi. Dignard & Maloney 03-604.

Sparganium hyperboreum Laestad. — Circumboréal — Eaux peu profondes. Peu fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-26; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.

Potamogetonaceae

Potamogeton gramineus L. — Circumboréal — Eaux peu profondes. Peu fréquent — 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat. Dignard & Maloney 03-573; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi. Dignard & Maloney 03-602.

Potamogeton richardsonii (Benn.) Rydb. — Boréal nord-américain — Eaux peu profondes. Peu fréquent — 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi. Dignard & Maloney 03-603.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Atteindrait sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (*vide* Haynes et Hellquist, 2000; Meades *et al.*, 2000).

Scheuchzeriaceae

Scheuchzeria palustris L. — Circumboréal — Mares de tourbières. Peu fréquent — 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney NAT02-103; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney 03-461; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney 03-512a.

Juncaginaceae

Triglochin maritimum L. — Circumboréal — Fens, Rare — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney 03-504.

Alismataceae

Sagittaria cuneata Sheldon — Boréal nord-américain — Eaux peu profondes, rives exondées. Peu fréquent — 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney 03-534; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, Dignard & Maloney 03-611.

Poaceae

Agrostis mertensii Trin. subsp. *borealis* (Hartm.) Tzvelev [= *A. borealis* Hartm.] — Circumboréal — Bords de ruisseaux, rochers exposés. Peu fréquent — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-20; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney 03-634.

Agrostis scabra Willd. [= *A. scabra* subsp. *septentrionalis* (Fern.) A. & D. Löve, *A. scabra* var. *geminata* (Trin.) Swallen, *A. hyemalis* (Walt.) B.S.P. var. *tenuis* (Tuck.) Gleason] — Boréal nord-américain — Rivages caillouteux, alluvions sableuses, prairies riveraines, brûlis. Assez fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., petite île sur la rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 30; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-75; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-120; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier, Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney 03-577, 03-580; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, Dignard & Maloney obs.

Anthoxanthum monticolum (Bigel.) Veldkamp subsp. *monticolum* [*Hierochloa alpina* (Sw. ex Willd.) Roemer & J.A. Schultes subsp. *orthantha* (T.J. Sørensen) G. Weim.] — Boréal nord-est américain, disjoint en Béringie — Rochers exposés. Rare — 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney 03-637.

Anthoxanthum hirtum (Schrank) Y. Schouten & Veldkamp subsp. *arcticum* (J. Presl) G.C. Tucker [= *Hierochloa hirta* (Schrank) Borbás subsp. *arctica* (J. Presl) G. Weim.; *H.*

odorata (L.) Beauv. subsp. *arctica* (J. Presl) Tzvelev] — Circumboréal — Alluvions sablonneuses. Rare — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-76.

Bromus ciliatus L. [= *B. canadensis* Michx.] — Boréal nord-américain et asiatique — Alluvions, prairies riveraines, sous-bois, arbustives, Assez fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., Maloney. Girard & Hébert 19; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-15; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney 03-426; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney 03-518.

Calamagrostis canadensis (Michx.) Beauv. *sensu lato* — Boréal nord-américain — Rivages caillouteux, prairies riveraines, arbustives, sous-bois, rochers humides, escarpements, brûlis. Fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., Maloney. Girard & Hébert 23; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-60; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.; 51°18'18,8"N.-61°41'44,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'18,8"N.-61°41'44,4"O., Gagnon obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°47'N.-61°19'O., au sud du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat. Dignard & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetsi, Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney obs.

Calamagrostis stricta (Timm) Koel. subsp. *stricta* [= *C. neglecta* (Ehrh.) P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.] — Circumboréal — Rivages caillouteux et sablonneux. Peu fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., Maloney. Girard & Hébert 24; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-121; 51°18'18,8"N.-61°41'44,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-95.

Cinna latifolia (Trev. ex Goepp.) Griseb. — Circumboréal — Arbustives, alluvions fines, sous-bois, arbustives. Peu fréquent — 50°43'59,0"N.-61°37'14,1"O., Maloney. Girard & Hébert 95; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Gagnon obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'18,8"N.-61°41'44,4"O., Gagnon obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney 03-652.

Danthonia spicata (L.) Beauv. ex Roemer & J.A. Schultes — Boréal nord-américain — Terrasse alluviale. Rare — 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier. Dignard & Maloney 03-436.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Cartographiée pour la région par Darbyshire (2003).

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. — Circumboréal à aire disjointe — Rives, sables secs, rochers exposés, dunes et sables éoliens, bords de ruisseaux, brûlis. Très fréquent —

51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Gagnon obs.; 51°47'N.-61°17'O., lac Fonteneau (Lavoie 1984); 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, *Dignard & Maloney 03-468*; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, *Dignard & Maloney obs.*; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué, *Dignard & Maloney obs.*; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau, *Dignard & Maloney obs.*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, *Dignard & Maloney obs.*; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, *Dignard & Maloney obs.*; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage, *Dignard & Maloney obs.*; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, *Dignard & Maloney obs.*; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, *Dignard & Maloney obs.*

Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinnars [= *Agropyron trachycaulum* (Link) Malte ex H.F. Lewis] — Boréal nord-américain — Rives, prairies riveraines, bords de ruisseaux. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier, *Dignard & Maloney 03-441*; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, *Dignard & Maloney obs.*

Glyceria canadensis (Michx.) Trin. — Tempéré nord-est américain — Rives humides, alluvions, prairies riveraines, bords de ruisseaux. Peu fréquent — 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Gagnon obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-31; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O. rivière Olomane, *Dignard & Maloney 03-553*.

Muhlenbergia uniflora (Muhl.) Fern. — Boréal nord-américain — Fens, Rare — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, *Dignard & Maloney 03-502*.

Piptatherum canadense (Poir.) Barkworth [= *Oryzopsis canadensis* (Poir.) Torrey] — Boréal nord-américain — Bords de ruisseaux. Rare — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-25.

Poa glauca M. Vahl — Arctique-alpin circumpolaire — Escarpement d'un haut sommet. Rare — 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat, *Dignard & Maloney 03-418*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Signalée pour la région par Scoggan (1978-1979).

Poa pratensis L. s.l. — Circumpolaire — Fens, Rare — 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, *Dignard & Maloney 03-620*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord.

Schizachne purpurascens (Torr.) Swallen — Circumboréal à aire disjointe — Prairies riveraines, sous-bois, arbustales. Peu fréquent — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-17; 51°47'N.-61°17'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, *Dignard & Maloney 03-519*.

Trisetum spicatum (L.) Richter — Circumboréal — Rives sablonneuses. Rare — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier, *Dignard & Maloney 03-443*.

Vahlodea atropurpurea (Wahl.) Fries ex Hartm. [= *Deschampsia atropurpurea* (Wahlenb.) Scheele] — Boréal amphi-atlantique — Bords de ruisseaux. Rare — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, *Dignard & Maloney 03-528*.

Cyperaceae

Carex aquatilis Wahl. var. *aquatilis* — Circumboréal — Fens, prairies riveraines, marais. Assez fréquent — 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, près de l'intersection avec sa branche ouest, *Maloney, Girard & Hébert 46*; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, *Dignard & Maloney obs.*; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, *Dignard & Maloney 03-541*; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, *Dignard & Maloney obs.*; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, *Dignard & Maloney obs.*

Carex bigelowii Torr. ex Schwein. — Arctique-alpin amphi-atlantique — Rives humides, rochers secs des hauts sommets, escarpements. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'30,2"O., *Blondeau & Maloney NAT02-72*; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., *Blondeau & Maloney NAT02-124*; 51°13'37,70"N.-61°24'23,6"O., *Blondeau & Maloney obs.*; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., *Blondeau & Maloney NAT02-13*; 51°43'N.-61°54'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, *Dignard & Maloney 03-411*; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier, *Dignard & Maloney 03-446*; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, *Dignard & Maloney 03-479*; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué, *Dignard & Maloney 03-486*; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage, *Dignard & Maloney 03-564*; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, *Dignard & Maloney 03-589*; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, *Dignard & Maloney 03-644*.

Carex brunescens (Pers.) Poir. [incl. subsp. *sphaerostachya* (Tuck.) Kalela] — Circumboréal — Rives sablonneuses, rochers, arbustives, alluvions, sous-bois. Assez fréquent — 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, près de l'intersection avec sa branche ouest, *Maloney, Girard & Hébert 44*; 51°27'N.-61°45'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°47'N.-61°17'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°47'N.-61°19'O., au sud du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°59'N.-61°44'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, *Dignard & Maloney 03-416*; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué, *Dignard & Maloney 03-488*; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, *Dignard & Maloney 03-582a*.

- Carex canescens*** L. — Circumboréal — Bords de ruisseaux, sous-bois, fens, arbustives. Peu fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Gagnon obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°47'N.-61°19'O., au sud du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney obs.; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, Dignard & Maloney obs.
- Carex chordorrhiza*** Ehrh. ex L. f. — Circumboréal — Fens. Rare — 51°53'N.-61°10'O., lac Kautshauakamit (banque de données MENV).
- Carex debilis*** Michx. var. ***rudget*** Bailey — Tempéré nord-est américain — Arbustives riveraines. Rare — 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane, Dignard & Maloney 03-554.
Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Atteindrait sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador. Nouveau pour l'est du Québec et la Côte-Nord (fide Rousseau, 1974; Scoggan, (1978-1979); Meades et al., 2000).
- Carex deflexa*** Hornem. — Boréal nord-américain — Rives sablonneuses, sables secs. Peu fréquent — 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-122; 51°52'N.-61°28'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage, Dignard & Maloney 03-567.
- Carex disperma*** Dewey — Circumboréal — Bords de ruisseaux, rives, sous-bois, arbustives riveraines. Rare — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-104; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-86.
- Carex echinata*** Murr. — Boréal amphi-atlantique — Rives humides, prairies riveraines, arbustives, fens. Peu fréquent — 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-97; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, Dignard & Maloney obs.
- Carex exilis*** Dewey — Boréal nord-est américain — Fens. Peu fréquent — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney obs.; 51°54'57,7"N.-61°15'43,2"O., 1 km au sud du lac Umuaku, Dignard & Maloney obs.
- Carex foenea*** var. ***foenea*** Willd. [= *C. argyrantha* Tuck. var. *aenea* (Fern.) Boivin] — Boréal nord-américain — Rivages sablonneux. Rare — 50°43'59,0"N.-61°37'14,1"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 96.
- Carex houghtoniana*** Torr. ex Dewey [= *C. houghtonii* Torr.] — Tempéré nord-américain — Rivages sablonneux. Rare — 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-123.
Atteindrait sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (fide Rousseau, 1974; Scoggan, 1978-1979 Lavoie, 1984; Meades et al., 2000).
- Carex intumescens*** Rudge — Tempéré nord-est américain — Sous-bois, arbustives. Rare — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-87.

Carex lenticularis Michx. — Boréal nord-américain — Rivages humides. Peu fréquent — 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-88; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-30.

Carex limosa L. — Circumboréal — Fens, tourbières ombrotrophes. Fréquent — 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney NAT02-098; 51°31'N.-61°50'O (Lavoie, 1984); 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. Dignard & Maloney obs.; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.; 51°54'57,7"N.-61°15'43,2"O., 1 km au sud du lac Umuaku. Dignard & Maloney 03-513; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney obs.; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.

Carex livida (Wahl.) Willd. — Circumboréal à aire disjointe — Fens. Peu fréquent — 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney 03-462; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.

Carex magellanica Lam. subsp. *irrigua* (Wahl.) Hult. [= *C. paupercula* Michx.] — Circumboréal — Fens. Peu fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-105; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°50'N.-61°23'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°55'N.-61°30'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney 03-522; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.

Carex oligosperma Michx. — Boréal nord-américain — Fens, tourbières ombrotrophes. Assez fréquent — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°53'N.-61°48'O., env. 24 km à l'ouest du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney 03-453; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.

Carex pauciflora Lightf. — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes, sous-bois tourbeux. Peu fréquent — 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney 03-467; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. Dignard & Maloney obs.

Carex projecta Mackenzie — Boréal nord-américain — Alluvions, terrasses sablonneuses, sous-bois, arbustives riveraines. Peu fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-64; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Nastashquan, Maloney. Girard & Hébert 18; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-125;

51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., *Blondeau & Maloney NAT02-89*; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, *Dignard & Maloney 03-422*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Signalée pour la région par Scoggan (1978-1979).

Carex rostrata Stokes — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes, fens, rives humides. Peu fréquent — 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, *Dignard & Maloney 03-447*; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane, *Dignard & Maloney 03-556*; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, *Dignard & Maloney 03-624*.

Carex saxatilis L. — Circumpolaire — Rives humides. Peu fréquent — 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., *Blondeau & Maloney NAT02-99*; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane, *Dignard & Maloney 03-547*.

Carex trisperma Dewey — Circumboréal — Tourbières, arbustives riveraines, sous-bois tourbeux, prairies riveraines. Fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., *Blondeau & Maloney obs.*; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., *Blondeau & Maloney obs.*; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., *Blondeau & Maloney obs.*; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, *Dignard & Maloney 03-450*; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, *Dignard & Maloney obs.*; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau, *Dignard & Maloney obs.*; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, *Dignard & Maloney obs.*

Carex utriculata Boott [= *C. rostrata* var. *utriculata* (Boott) Bailey] — Circumboréal — Bords de ruisseaux. Peu fréquent — 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., *Blondeau & Maloney NAT02-90*.

Inclus dans *C. rostrata* s.l. dans Lavoie (1984).

Carex vesticaria L. — Circumboréal — Prairies riveraines, marais, bords de ruisseaux — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., *Blondeau & Maloney NAT02-106*; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., *Blondeau & Maloney NAT02-22*.

Dulichium arundinaceum (L.) Britt. — Tempéré nord-américain — Rivages humides. Rare — 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, près de l'intersection de la rivière avec sa branche ouest, *Maloney, Girard & Hébert 45*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Atteindrait sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (*vide* Rousseau, 1974; Scoggan, 1978-1979; Meades et al., 2000; Mastrogiuseppe, 2002).

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & J.A. Schultes — Cosmopolite — Rivages humides, rives exondées alluvions fines. Peu fréquent — 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., *Blondeau & Maloney NAT02-91*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, *Dignard & Maloney obs.*; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, *Dignard & Maloney 03-608*; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, *Dignard & Maloney 03-621*.

- Eriophorum angustifolium* Honckeny — Circumboréal — Fens, tourbières ombrotrophes. Peu fréquent — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. Dignard & Maloney obs.
- Eriophorum russeolum* Fries ex Hartm. subsp. *russeolum* — Fens. Peu fréquent — Circumboréal — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney 03-510.
- Eriophorum tenellum* Nutt. — Boréal nord-est américain — Tourbières ombrotrophes. Rare — 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney 03-463.
- Eriophorum vaginatum* L. subsp. *spissum* (Fern.) Hult. [= *E. spissum* Fern.] — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes. Assez fréquent — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney 03-491; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-631.
- Eriophorum virginicum* L. — Tempéré nord-est américain — Tourbières ombrotrophes. Rare — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney NAT02-50.
- Eriophorum viridicarinatum* (Engelm.) Fern. — Boréal nord-américain — Fens. Peu fréquent — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney 03-506; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. Dignard & Maloney obs.
- Rhynchospora alba* (L.) Vahl — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes. Rare — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney NAT02-47.
- Scirpus atrocinctus* Fern. — Boréal nord-américain — Rivages humides, arbustives riveraines, fens. Peu fréquent — 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-29; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane. Dignard & Maloney 03-552; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney 03-575; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi. Dignard & Maloney obs.
- Scirpus microcarpus* J. & K. Presl [= *S. rubrotinctus* Fern.] — Boréal nord-américain et asiatique — Rivages humides, prairies riveraines. Assez fréquent — 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, près de l'intersection de la rivière avec sa branche ouest. Maloney, Girard & Hébert 48; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-23; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney 03-529; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane. Dignard & Maloney 03-551; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi. Dignard & Maloney obs.
- Trichophorum caespitosum* (L.) Hartm. [= *Scirpus caespitosus* var. *austriacus* (Pallas) Aschers. & Graebn., *S. caespitosus* var. *callosus* Bigel.] — Circumboréal — Tourbières

ombrotrophes, fens, rives humides, Fréquent — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat. *Dignard & Maloney 03-415*; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. *Dignard & Maloney obs.*; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. *Dignard & Maloney obs.*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. *Dignard & Maloney obs.*; 51°54'57,7"N.-61°15'43,2"O., 1 km au sud du lac Umuaku. *Dignard & Maloney 03-513*; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. *Dignard & Maloney obs.*; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. *Dignard & Maloney obs.*; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. *Dignard & Maloney obs.*

Juncaceae

Juncus brevicaudatus (Engelm.) Fern. — Boréal nord-américain — Rives humides, alluvions, fens. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, près de l'intersection de la rivière avec sa branche ouest. *Maloney, Girard & Hébert 43*; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-129; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. *Dignard & Maloney obs.*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. *Dignard & Maloney 03-512*; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. *Dignard & Maloney 03-582*.

Juncus filiformis L. — Circumboréal — Rivages humides, bords de ruisseaux, prairies riveraines. Assez fréquent — 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. *Dignard & Maloney 03-521*; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. *Dignard & Maloney obs.*; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetsi. *Dignard & Maloney obs.*

Juncus pelocarpus E. Mey. — Tempéré nord-est américain — Fens. Rare — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. *Dignard & Maloney 03-512b*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Atteindrait dans la région sa limite de répartition septentrionale dans l'est du Québec (*vide* Brooks et Clemants, 2000).

Juncus stygius L. subsp. *americanus* (Buch.) Hult. — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes, fens. Peu fréquent — 51°31'N.-61°50'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. *Dignard & Maloney 03-448*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. *Dignard & Maloney 03-511*.

Juncus subtilis E. Meyer — Boréal nord-américain — Alluvions fines, rives exondées, eaux peu profondes. Peu fréquent — 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-93; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de

l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane. *Dignard & Maloney 03-550*; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. *Dignard & Maloney 03-607*; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord.

Juncus trifidus L. — Arctique-alpin amph-atlantique — Rochers. Rare — 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. *Dignard & Maloney 03-636*.

Liliaceae

Clintonia borealis (Ait.) Raf. — Boréal du nord-est américain — Sous-bois, arbustives, Fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan. *Maloney, Girard & Hébert 73, 79*; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

Maianthemum canadense Desf. — Boréal nord-américain — Alluvions, arbustives riveraines, sous-bois. Fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. *Maloney, Girard & Hébert 92*; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Gagnon obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat, Dignard & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. Dignard & Maloney obs.; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane. *Dignard & Maloney 03-561*; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt. Dignard & Maloney obs.

Maianthemum trifolium (L.) Sloboda [= *Smilacina trifolia* (L.) Desf.] — Boréal nord-américain et asiatique — Tourbières ombrotrophes, fens, sous-bois tourbeux. Assez fréquent — 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. *Dignard & Maloney 03-451*; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.

Streptopus amplexifolius (L.) DC. var. *amplexifolius* — Circumboréal — Arbustives. Peu fréquent — 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.

Streptopus lanceolatus (Ait.) Reveal var. *lanceolatus*, [= *S. roseus* Michx. var. *perspectus* Fassett] — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustives. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-52; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 63.

Atteindrait dans la région sa limite de répartition septentrionale dans l'est du Québec (fide Utech, 2002).

Iridaceae

Iris versicolor L. — Boréal nord-est américain — Rives humides, sous-bois tourbeux. Peu fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-73; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 14; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-128; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-34; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

Atteindrait dans la région sa limite de répartition septentrionale dans l'est du Québec (fide Henderson, 2002).

Orchidaceae

Goodyera repens (L.) R. Br. ex Ait. f. — Circumboréal — Sous-bois. Peu fréquent — 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-10; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkuniapiu, Dignard & Maloney obs.

Listera cordata (L.) R. Br. ex Ait. f. — Circumboréal — Sous-bois. Peu fréquent — 51°39'N.-61°35'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984).

Platanthera obtusata (Banks ex Pursh) Lindl. [= *Habenaria obtusata* (Banks ex Pursh) Richards. (incl. var. *collectanea* Fern.)] — Boréal nord-américain — Sous-bois. Peu fréquent — 51°39'N.-61°35'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984).

Angiospermes dicotylédones

Salicaceae

Populus balsamifera L. — Boréal nord-américain — Rivages. Peu fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-77.

Populus tremuloides Michx. — Boréal nord-américain — Tills, sables fluvioglacière, terrasses lacustres, épandages. Peu fréquent — 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkuniapiu Dignard & Maloney 03-482; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O. montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O. côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, Dignard & Maloney obs.

Salix argyrocarpa Anderss. — Boréal nord-est américain — Bords de ruisseaux, rivages humides, fens riverains. Peu fréquent — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-14; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier, Dignard & Maloney 03-438; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney obs.; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. Dignard & Maloney obs.

Salix hebbiana Sarg. — Circumboréal — Rochers et sols minces, sables secs. Peu fréquent — 51°59'N.-61°44'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney 03-489; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage, Dignard & Maloney 03-570.

Salix cordata Michx. — Boréal nord-est américain — Rivages humides, arbustives riveraines. Assez fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 32; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-58, NAT02-63, NAT02-133; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-7; 51°49'N.-61°52'O., env. 27 km à l'ouest du lac Fonteneau (Lavoie, 1984) ; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney 03-428.

Le spécimen NAT02-63, selon G.W. Argus (*in litt.*, 2002), ne correspond pas au *S. cordata* typique. « The leaves even have a suggestion of wax on the abaxial surface. If it was within the range of *S. eriocephala*, I would suggest that it may be a hybrid. ».

Salix humilis Marsh. — Boréal nord-est américain — Alluvions, sables humides, arbustives riveraines, rochers, brûlis. Assez fréquent — 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney 03-452; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney 03-474, 03-481; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage, Dignard & Maloney 03-568; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney 03-584; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, Dignard & Maloney 03-655.

Salix lucida Muhl. — Boréal nord-est américain — Rives sablonneuses, arbustives riveraines, 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-37; 51°31'N.-61°50'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-5; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney 03-423; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. Dignard & Maloney obs.

Salix pedicellaris Pursh — Boréal nord-américain — Fens riverains, fens. Peu fréquent — 51°47'N.-61°17'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km

au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, *Dignard & Maloney 03-500*; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O. 7,5 km au sud du lac Cobaz. *Dignard & Maloney 03-628, 03-629*.

Salix pellita (Anderss.) Anderss. ex Schneid. — Boréal nord-est américain — Rives humides, arbustives riveraines. Assez fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan. *Maloney, Girard & Hébert 28*; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-6; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier. *Dignard & Maloney 03-439*; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi. *Dignard & Maloney 03-618*.

Salix planifolia Pursh — Boréal nord-américain — Rives sablonneuses, arbustives riveraines, sables humides. Assez fréquent — 51°31'N.-61°50'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°47'N.-61°19'O., au sud du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. *Dignard & Maloney 03-422*; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage. *Dignard & Maloney 03-565*; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. *Dignard & Maloney 03-584a, 03-595*.

Salix pyrifolia Anderss. — Boréal nord-américain — Rochers, sables humides, arbustives riveraines. Assez fréquent — 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°43'N.-61°54'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. *Dignard & Maloney 03-414*; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. *Dignard & Maloney 03-473*; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. *Dignard & Maloney 03-492*; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage. *Dignard & Maloney 03-569*.

Myricaceae

Myrica gale L. — Circumboréal à aire disjointe — Arbustives riveraines, rives caillouteuses ou sablonneuses. Peu fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan. *Maloney, Girard & Hébert 27*; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°31'N.-61°50'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. *Dignard & Maloney obs.*; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi. *Dignard & Maloney obs.*

Betulaceae

Alnus incana (L.) Moench subsp. *rugosa* (Du Roi) Clausen [= *A. rugosa* (Du Roi) Spreng.] — Boréal nord-américain — Arbustives riveraines, sous-bois, fens, prairies riveraines. Fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Gagnon obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Gagnon obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-9; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de

l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, Dignard & Maloney obs.

Alnus viridis (Vill.) Lam. & DC. subsp. *crispa* (Ait.) Turrill [= *A. crispa* (Ait.) Pursh] — Boréal nord-américain et asiatique — Sous-bois, rivages sabonneux, sables secs, rives rocailleuses, brûlis, rochers. Fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 29; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

Betula cordifolia Regel [= *B. papyrifera* Marsh. var. *cordifolia* (Regel) Fern.] — Boréal nord-américain — Tills, épandages, rochers, colluvions, terrasses fluvioglaciales, brûlis. Assez fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Gagnon obs.; 51°31'N. 61°50'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-3; 51°43'N.-61°54'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat. Dignard & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkuniapiu, Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

Betula glandulosa Michx. — Boréal nord-américain — Rives sableuses, arbustives et prairies riveraines, sables secs, terrasses, rochers, brûlis. Très fréquent — 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°49'N.-61°52'O., env. 27 km à l'ouest du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, Dignard & Maloney 03-469; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau, Dignard & Maloney obs.; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney obs.; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage. Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, Dignard & Maloney obs.

Betula michauxii Spach — Boréal nord-est américain — Fens. Peu fréquent — 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney 03-466; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du

lac Kautshauakamit, *Dignard & Maloney 03-507*; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. *Dignard & Maloney 03-571*.

Betula minor (Tuck.) Fern. — Boréal nord-est américain — Rochers, escarpements, arbustaies riveraines. Peu fréquent — 51°52'N.-61°28'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. *Dignard & Maloney 03-410*; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. *Dignard & Maloney 03-470*; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. *Dignard & Maloney 03-480*; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué. *Dignard & Maloney 03-490*; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. *Dignard & Maloney obs.*; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. *Dignard & Maloney obs.*

Betula papyrifera Marsh. *sensu lato* — Boréal nord-américain — Rivages, tills, épandages, rochers, colluvions, brûlis. Fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. *Maloney. Girard & Hébert 13*; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.

Betula pumila L. var. *glandulifera* Regel — Boréal nord-américain. Peu fréquent — 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. *Dignard & Maloney 03-514*.

Santalaceae

Geocaulon lividum (Richards.) Fern. [= *Comandra lividum* Richards.] — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustaies, brûlis. Peu fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. *Dignard & Maloney 03-478*; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. *Dignard & Maloney 03-645*.

Nymphaeaceae

Nuphar lutea (L.) Sm. subsp. *variegata* (Dur.) E.O. Beal [= *N. variegata* Engelm.] — Boréal nord-américain — Eaux peu profondes. Peu fréquent — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. *Dignard & Maloney 03-472*; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. *Dignard & Maloney obs.*

Ranunculaceae

Actaea rubra (Ait.) Willd. — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustaies. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°14'45,0"N.-61°43'57,0"O., rivière Natashquan, un peu au sud de la fourche de la Natashquan-Est. *Maloney. Girard & Hébert 39*.

Coptis trifolia (L.) Salisb. [= *C. groenlandica* (Oeder) Fern.] — Boréal nord-américain — Sous-bois. Assez fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, *Dignard & Maloney 03-476*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, *Dignard & Maloney obs.*; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat, *Dignard & Maloney obs.*; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, *Dignard & Maloney obs.*; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, *Dignard & Maloney obs.*

Ranunculus aquatilis L. var. *diffusus* With. — Circumboréal — Eaux peu profondes. Rare. 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, *Dignard & Maloney 03-539*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord.

Ranunculus flammula L. var. *filiformis* (Michx.) Hook. [= *R. reptans* var. *filiformis* (Michx.) DC.] — Circumboréal — Rives exondées. Peu fréquent — 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., rivière Natashquan, *Blondeau & Maloney NAT02-36*; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, *Dignard & Maloney 03-539b*; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, *Dignard & Maloney obs.*

Ranunculus pensylvanicus L. f. — Boréal nord-américain — Alluvions. Rare — 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, *Dignard & Maloney 03-433*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Cartographiée pour la région par Whittemore (1997)

Thalictrum pubescens Pursh — Boréal nord-est américain — Alluvions, arbustives et herbaçées riveraines. Peu fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., *Blondeau & Maloney NAT02-82*; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert 3*; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., *Blondeau & Maloney NAT02-42*; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, *Dignard & Maloney obs.*

Brassicaceae

Cardamine pensylvanica Muhl. ex Willd. — Boréal nord-américain — Rives humides, bords de ruisseaux. Peu fréquent — 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., rivière Natashquan, *Blondeau & Maloney NAT02-35*; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, *Dignard & Maloney 03-612*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord.

Subularia aquatica L. var. *americana* (Mulligan & Calder) Boivin — Circumboréal — Rives exondées, eaux peu profondes. Peu fréquent — 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., rivière Natashquan, *Blondeau & Maloney NAT02-28*; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, *Dignard & Maloney 03-533*.

Sarraceniaceae

Sarracenia purpurea L. — Boréal nord-américain — Tourbières ombrotrophes. Assez fréquent — 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. *Dignard & Maloney 03-464*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. *Dignard & Maloney obs.*; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. *Dignard & Maloney obs.*; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. *Dignard & Maloney obs.*

Droseraceae

Drosera anglica Huds. — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes, Fens. Rare — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., *Blondeau & Maloney NAT02-49*.

Drosera rotundifolia L. — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes, fens. Assez fréquent — 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Gagnon obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. *Dignard & Maloney 03-449*; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. *Dignard & Maloney obs.*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. *Dignard & Maloney obs.*; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. *Dignard & Maloney 03-532*.

Saxifragaceae

Mitella nuda L. — Boréal nord-américain et asiatique — Sous-bois, arbustaies. Rare — 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.

Ribes glandulosum Grauer — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustaies, bords de ruisseaux. Assez fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°31'N.-61°50'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. *Dignard & Maloney 03-483*; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. *Dignard & Maloney 03-650a*.

Ribes lacustre (Pers.) Poir. — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustaies, bords de ruisseaux. Assez fréquent — 50°43'59,0"N.-61°37'14,1"O., *Maloney. Girard & Hébert 93*; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., *Blondeau & Maloney NAT02-11*; 52°00'N.-61°41'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. *Dignard & Maloney 03-650*.

Ribes triste Pallas — Boréal nord-américain et asiatique — Sous-bois, arbustaies. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Gagnon obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. *Dignard & Maloney obs.*

Rosaceae

Amelanchier bartramiana (Tausch) Roemer — Boréal nord-est américain — Sous-bois, arbustives, bords de ruisseaux, tourbières. Assez fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan, près de la sixième chute, *Maloney, Girard & Hébert 51*; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°59'N.-61°44'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney 03-542; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat, Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney 03-590; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

Comarum palustre L. [= *Potentilla palustris* (L.) Scop.] — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes, fens, prairies riveraines. Assez fréquent — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney 03-495; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney 03-530; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi, Dignard & Maloney 03-609; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, Dignard & Maloney obs.

Potentilla norvegica L. — Circumboréal — Rivages sablonneux, bords de ruisseaux. Peu fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., *Maloney, Girard & Hébert 20*; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney NAT02-67; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.

Prunus pensylvanica L. f. — Boréal nord-américain — Rivages, sables secs, rochers, brûlis. Peu fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert 17*; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, Dignard & Maloney obs.

Rubus acaulis Michx. [= *R. arcticus* L. subsp. *acaulis* (Michx.) Focke] — Boréal nord-américain — Arbustives et prairies riveraines. Peu fréquent — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney 03-509; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney obs.

Rubus chamaemorus L. — Circumboréal — Tourbières, dépôts organiques minces, rochers suintants. Fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.; 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney 03-411b; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney 03-460; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-

Est, Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat. Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.

***Rubus idaeus* L. subsp. *strigosus* (Michx.) Focke** — Circumboréal — Sous-bois, arbustives, bords de ruisseaux. Peu fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 7; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°49'N.-61°52'O., env. 27 km à l'ouest du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney obs.

***Rubus pubescens* Raf.** — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustives, bords de ruisseaux. Assez fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 91; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Gagnon obs.; 51°27'N.-61°45'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°47'N.-61°17'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney 03-520; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane. Dignard & Maloney 03-558; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney 03-579a; 51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. Dignard & Maloney obs.

***Sanguisorba canadensis* L.** — Boréal nord-est américain — Rives sablonneuses, arbustives riveraines. Peu fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 25; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

***Sibbaldiopsis tridentata* (Ait.) Rydb. [= *Potentilla tridentata* Ait.]** — Boréal nord-américain — Rivages sablonneux, sables secs, arbustives, brûlis. Fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 16; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°55'N.-61°30'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier. Dignard & Maloney obs.; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-

59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, Dignard & Maloney obs.

Sorbus americana Marsh. — Tempéré nord-est américain — Rivages sablonneux. Rare — 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-132.

Sorbus decora (Sarg.) Schneid. — Boréal nord-américain — Sous-bois, rochers, escarpements, terrasses sablonneuses, brûlis. Fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Gagnon obs.; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 5; 52°00'N.-61°41'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney 03-601; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

Spiraea alba Du Roi var. *latifolia* (Ait.) Dippel [= *S. latifolia* (Ait.) Borkh.] — Boréal nord-est américain — Rivages caillouteux, arbustives et prairies riveraines. Fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 35; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-83; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.

Oxalidaceae

Oxalis montana Raf. — Tempéré nord-est américain — Sous-bois. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 65; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.

Callitrichaceae

Callitriche palustris L. [= *C. verna* L.] — Circumboréal — Eaux peu profondes, rives exondées. Peu fréquent — 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-85; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O. 7,5 km au sud du lac Cobaz, Dignard & Maloney obs.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord.

Empetraceae

Empetrum nigrum L. subsp. *hermaphroditum* (Lange ex Hagerup) Böcher — Circumboréal — Rochers, tourbières, sables secs, brûlis. Très fréquent — 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney 03-456; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac

Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.

Aquifoliaceae

Ilex mucronata (L.) Powell [= *Nemopanthus mucronatus* (L.) Trel.] — Tempéré nord-est américain — Sous-bois, tourbières ombrotrophes. Assez fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 82; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney 03-587; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-648.

Atteint sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (fide Rousseau, 1974; Scoggan 1978-1979; Lavoie, 1984; Meades *et al.*, 2000). Taxonomie selon Powell *et al.* (2000).

Aceraceae

Acer spicatum Lam. — Tempéré nord-est américain — Rivages sableux, sous-bois. Peu fréquent — 50°43'59,0"N.-61°37'14,1"O., Maloney. Girard & Hébert 94; 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-53; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°27"N.-61°45"O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984).

Cistaceae

Hudsonia tomentosa Nutt. — Boréal nord-est américain. Rare — Dunes et sables éoliens, 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt. Dignard & Maloney 03-654; 51°35'07,2"N.-59°59'25,4"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 5,8 km au sud du lac Hakluyt. Dignard & Maloney 03-657.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. L'espèce est aussi présente dans la région de Goose Bay au Labrador (fide Rousseau, 1974; Scoggan 1978-1979; Petitclerc et Dignard, 2004).

Violaceae

Viola blanda Willd. var. *palustriformis* Gray [= *V. incognita* Brainerd] — Boréal nord-est américain — Sous-bois, arbustives. Peu fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 8; 51°14'45,0"N.-61°43'57,0"O., rivière Natashquan, un peu au sud de la fourche de la Natashquan Est. Maloney. Girard & Hébert 40; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-21; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney 03-625.

Viola labradorica Schrank [= *V. adunca* Sm. var. *minor* (Hook.) Fern.] — Boréal nord-américain — Bords de ruisseaux, prairies et arbustives riveraines. Peu fréquent — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-19; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney 03-505; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney 03-517.

Viola macloskeyi Lloyd subsp. *pallens* (Banks ex Ging) M.S. Baker [= *V. pallens* (Banks ex Ging) Brainerd] — Boréal nord-américain — Bords de ruisseaux, rives sablonneuses, prairies et arbustaies riveraines. Assez fréquent — 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-110; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-43; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney 03-542a; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney 03-586.

Onagraceae

Chamerion angustifolium (L.) Holub [= *Epilobium angustifolium* L.] — Circumboréal — Rivages, sables secs, rochers, arbustaies, brûlis. Très fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 1; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat, Dignard & Maloney obs.; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau, Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux, Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, Dignard & Maloney obs.

Chamerion latifolium (L.) Holub [= *Epilobium latifolium* L.] — Circumboréal — Alluvions, rivages caillouteux. Peu fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-55, NAT02-74; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 22; 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan, près de la sixième chute, Maloney, Girard & Hébert 88; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-32; 51°52'N.-61°28'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney 03-429; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney 03-591.

Circaea alpina L. — Circumboréal — Sous-bois, arbustaies riveraines. Peu fréquent — 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 59; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-107.

Epilobium ciliatum Raf. subsp. *ciliatum* — Boréal nord-américain — Alluvions, rives humides, bords de ruisseaux. Peu fréquent — 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-127; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney 03-422; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi, Dignard & Maloney 03-619.

Epilobium palustre L. — Circumboréal — Fens et arbustaies riveraines. Peu fréquent — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney 03-503; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, Dignard & Maloney 03-630.

Haloragaceae

Myriophyllum tenellum Bigelow — Tempéré nord-américain — Rives sablonneuses. Rare — 51°52'N.-61°28'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984).

Hippuridaceae

Hippuris vulgaris L. — Circumboréal — Eaux peu profondes, marais, rives exondées. Peu fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-66; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney 03-531; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney 03-537; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat, Dignard & Maloney 03-574; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetschi, Dignard & Maloney 03-606.

Araliaceae

Aralia hispida Vent. — Boréal nord-est américain — Sables secs, dunes, brûlis. Peu fréquent — 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage, Dignard & Maloney 03-563; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, Dignard & Maloney obs.

Aralia nudicaulis L. — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustaies. Peu fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-78; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 10; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney 03-581; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux, Dignard & Maloney obs.

Apiaceae

Cicuta bulbifera L. — Boréal nord-américain — Arbustaies et herbaies riveraines. Peu fréquent — 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney 03-540; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetschi Dignard & Maloney 03-613.

Cornaceae

Cornus canadensis L. — Boréal nord-américain et asiatique — Sous-bois, arbustaies, brûlis, sables éoliens, sommets exposés, bords de ruisseaux. Fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 58; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Gagnon obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac

Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt. Dignard & Maloney obs.

***Cornus sericea* L. subsp. *sericea* [= *C. stolonifera* (Michx.) Rydb.]** — Boréal nord-américain — Arbustives et prairies riveraines, sous-bois, fens, brûlis, bords de ruisseaux. Fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-80; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 6; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-40; 51°31'N.-61°50'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney 03-588; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney obs.

Pyrolaceae

***Moneses uniflora* (L.) Gray** — Circumboréal — Sous-bois. Peu fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 74; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-114; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.

***Monotropa hypopithys* L. [= *Hypopitys monotropa* Crantz]** — Circumboréal — Sous-bois. Rare — 50°47'N.-61°40'O., rivière Natashquan (banque de données MENV).

***Monotropa uniflora* L.** — Circumtempéré — Sous-bois. Peu fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 72; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-68, NAT02-118a; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.

***Orthilia secunda* (L.) House [= *Pyrola secunda* L.]** — Circumboréal. Sous-bois. Peu fréquent — 51°04'06,9"N.-61°32'01,6"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 36; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°49'N.-61°52'O., env. 27 km à l'ouest du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. Dignard & Maloney obs.

Ericaceae

Andromeda polifolia L. var. *glaucophylla* (Link) DC. [= *A. glaucophylla* Link.] — Boréal nord-est américain — Tourbières ombrotrophes, fens. Assez fréquent — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney NAT02-48; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney obs.; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. Dignard & Maloney obs.; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney obs.; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.

Arctostaphylos alpina (L.) Spreng. [= *Arctous alpina* (L.) Niedenzu] — Arctique-alpin circumpolaire — Rochers des hauts sommets. Rare — 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-4; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney 03-412; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney 03-487; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-632.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. — Circumboréal — Dunes et sables éoliens, brülis. Peu fréquent — 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage. Dignard & Maloney 03-566; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt. Dignard & Maloney 03-656.

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench [= *Cassandra calyculata* (L.) D. Don] — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes, fens, arbustives riveraines, bords de ruisseaux, sous-bois. Très fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.; 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'42,2"N.-61°24'34,6"O., Gagnon obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney 03-454; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. Dignard & Maloney obs.; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney obs.; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.

Epigaea repens L. [incl. var. *glabrifolia* Fern.] — Boréal nord-est américain — Sous-bois, brülis. Rare — 51°47'N.-60°02'O., rivière du Petit Mécatina (banque de données MENV).

***Gaultheria hispidula* (L.) Muhl. ex Bigel. [= *Chiogenes hispidula* (L.) Torr. & Gray]** — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustives. Fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelluë, Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu, Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau, Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat, Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

***Kalmia angustifolia* L.** — Boréal nord-est américain — Sous-bois, tourbières ombrotrophes, fens, rochers, arbustives et prairies riveraines, brûlis. Très fréquent — 50°40'41,2"N.-61°40'07,7"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 97; 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 80; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Gagnon obs.; 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Gagnon obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest Dignard & Maloney 03-640.

***Kalmia polifolia* Wangenh.** — Boréal nord-américain — Tourbières ombrotrophes, fens. 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.; 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Gagnon obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Gagnon obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney 03-414a; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney 03-455; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney obs.; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau, Dignard & Maloney obs.; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens, Dignard & Maloney obs.; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil, Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney obs.

***Ledum groenlandicum* Oeder [= *Rhododendron groenlandicum* (Oeder) Kron & Judd]** — Boréal nord-américain — Tourbières ombrotrophes, sous-bois, bords de ruisseaux, brûlis, fens

riverains. Très fréquent — 50°40'41,2"N.-61°40'07,7"O., rivière Natashquan. *Maloney. Girard & Hébert* 98, 99; 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan. *Maloney. Girard & Hébert* 77; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Gagnon obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Gagnon obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. Dignard & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney obs.; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney obs.; 51°49'27,4"N.-59°42'57,7"O., 2 km au sud du lac Chenil. Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

***Rhododendron canadense* (L.) Torr.** — Tempéré nord-est américain — Sous-bois, tourbières ombrotrophes, brûlis, arbustaies et prairies riveraines, fens. Fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan. *Maloney. Girard & Hébert* 78; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

***Vaccinium angustifolium* Ait.** — Boréal nord-est américain — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan, près de la sixième chute. *Maloney. Girard & Hébert* 49; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.; 51°39'N.-61°35'O., rivière Natashquan (Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney 03-413; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkuniupiu. Dignard & Maloney obs.; 51°32'58,5"N.-60°00'33,5"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, sur l'ancienne piste d'atterrissage. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney

obs.: 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

Vaccinium boreale Hall & Aalders — Boréal nord-est américain — Sous-bois, brûlis, bords de ruisseaux, arbustives. Peu fréquent — 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Gagnon obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt, Dignard & Maloney obs.

Inclus dans *V. angustifolium* s.l. dans Lavoie (1984).

Vaccinium caespitosum Michx. — Boréal nord-américain — Bords de ruisseaux, arbustives riveraines, sous-bois, rochers, brûlis. Assez fréquent — 50°57'57,4"N.-61°36'28,9"O., rivière Natashquan, en amont de la sixième chute, Maloney, Girard & Hébert 37; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat, Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest, Dignard & Maloney 03-643.

Vaccinium myrtilloides Michx. — Boréal nord-américain — Sous-bois, brûlis, tourbières ombrotrophes, arbustives. Peu fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 81; 51°03'29,2"N.-61°33'21,1"O., Blondeau & Maloney NAT02-119; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Gagnon obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat, Dignard & Maloney obs.

Vaccinium ovalifolium Sm. — Boréal cordillérien disjoint dans l'est — Sous-bois. Rare — 51°23'N.-61°53'O., rivière Natashquan (banque de données MENV); 51°21'N.-61°07'O., rivière Olomane (Lavoie, 1984).

Vaccinium oxycoccus L. — Circumboréal — Tourbières ombrotrophes. Assez fréquent — 51°13'20,5"N.-61°41'38,8"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon, Dignard & Maloney 03-457; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est, Dignard & Maloney obs.; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, Dignard & Maloney obs.

Vaccinium uliginosum L. [incl. *V. uliginosum* subsp. *gaultherioides* (Bigelow) S.B. Young] — Circumboréal — Bords de ruisseaux, prairies et arbustives riveraines, sous-bois, tourbières ombrotrophes, fens, brûlis. Très fréquent — 50°57'57,4"N.-61°36'28,9"O., rivière Natashquan, en amont de la sixième chute, Maloney, Girard & Hébert 38; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Gagnon obs.; 51°53'N.-61°48'O., env. 24 km à l'ouest du lac Fonteneau

(Lavoie, 1984); 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney obs.; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. Dignard & Maloney obs.; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney 03-579; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.

Vaccinium vitis-idaea L. subsp. ***minus*** (Lodd.) Hult. — Circumboréal — Bords de ruisseaux, sous-bois, brûlis, sables secs, rochers dunes et sables éoliens. Assez fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 67; 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Gagnon obs.; 51°55'N.-61°30'O., lac Fonteneau (Lavoie, 1984) 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney obs.; 51°54'08,1"N.-61°43'36,0"O., rive nord de la rivière Matshehu, 3 km en amont de la rivière Nastashquan-Est. Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°32'40,2"N.-59°58'47,8"O., côté est de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt. Dignard & Maloney obs.

Diapensiaceae

Diapensia lapponica L. var. ***lapponica*** — Arctique-alpin amphi-atlantique — Rochers et sols détritiques. Rare — 51°36'41,0"N.-61°45'30,4"O., sommet situé à 9 km au sud du lac Kerdelhué. Dignard & Maloney 03-485; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney 03-633.

Primulaceae

Lysimachia terrestris (L.) B.S.P. — Boréal nord-est américain — Rivages humides, alluvions, arbustives riveraines. Peu fréquent — 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-38; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney 03-541a; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. Dignard & Maloney 03-610.

Trientalis borealis Raf. — Boréal nord-américain — Sous-bois, arbustives riveraines. Assez fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, en amont de la sixième chute. Maloney. Girard & Hébert 4; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Gagnon obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Gagnon obs.; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakakamat. Dignard & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. Dignard

& Maloney 03-475; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakaukamat. Dignard & Maloney obs.; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney obs.

Gentianaceae

Gentiana linearis Froel. — Boréal nord-est américain — Fens, prairies et arbustives riveraines. Peu fréquent — 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-100; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-41; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney 03-501.

Menyanthes trifoliata L. subsp. *verna* (Raf.) Gervais & Parent — Boréal nord-est américain — Fens. Assez fréquent — 51°57'18,5"N.-62°24'21,0"O., rive nord de la rivière Kachekaosipou, ca 1,5 km en amont du lac Bégon. Dignard & Maloney 03-458; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.; 51°54'57,7"N.-61°15'43,2"O., 1 km au sud du lac Umuaku. Dignard & Maloney 03-513.

Taxonomie selon Gervais et Parent (2003).

Lamiaceae

Lycopus uniflorus Michx. — Boréal nord-américain et asiatique — Rivages humides, rives exondées, arbustives et prairies riveraines. Peu fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. Maloney. Girard & Hébert 15; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-94; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier. Dignard & Maloney 03-445; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane. Dignard & Maloney 03-557; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina. Dignard & Maloney 03-576.

Mentha arvensis L. [= *M. canadensis* L.] — Circumboréal — Arbustives riveraines. Rare — 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi Dignard & Maloney 03-615.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Atteindrait vers l'est la région de Goose Bay (Rousseau, 1974; Meades *et al.*, 2000).

Scutellaria galericulata L. [= *S. epilobiifolia* A. Hamilton] — Boréal nord-américain — Arbustives riveraines, fens riverains. Peu fréquent — 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kaupistetshi. Dignard & Maloney 03-616; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney 03-623.

Scutellaria lateriflora L. — Boréal nord-américain — Arbustaies et prairies riveraines, rives caillouteuses. Peu fréquent — 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-96; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. Dignard & Maloney 03-430.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Ces récoltes représentent une extension considérable de l'aire de répartition du taxon vers le nord-est puisqu'il ne semble pas avoir encore été signalé de façon définitive au Québec à l'est de Tadoussac. Atteindrait sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (*vide* Rousseau 1974, Scoggan 1978-1979; Fleurbec, 1987; Meades *et al.*, 2000).

Scrophulariaceae

Melampyrum lineare Desr. — Boréal nord-américain — Brûlis. Rare — 51°07'N.-61°35'O., rivière Natashquan, nord du lac Poulet (Lavoie, 1984); 51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O., Blondeau & Maloney NAT02-45.

Atteindrait sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (*vide* Rousseau, 1974; Scoggan, 1978-1979; Meades *et al.*, 2000).

Veronica scutellata L. — Circumboréal — Rives exondées, arbustaies riveraines, fens riverains. Peu fréquent — 51°23'N.-61°53'O., lac Jonchée (Lavoie, 1984); 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., rivière Natashquan. Blondeau & Maloney NAT02-27; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane. Dignard & Maloney 03-560; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. Dignard & Maloney 03-614.

Lentibulariaceae

Utricularia cornuta Michx. — Tempéré nord-est américain — Fens. Rare — 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney 03-497.

Utricularia intermedia Hayne — Circumboréal — Eaux peu profondes, fens. Peu fréquent — 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-101; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.

Utricularia macrorhiza Le Conte [= *U. vulgaris* L. *pro parte*] — Circumboréal — Eaux peu profondes, fens. Fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-54; 51°13'42,2"N.-61°24'34,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-102; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. Dignard & Maloney obs.; 51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O., rivière Olomane. Dignard & Maloney 03-545; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. Dignard & Maloney 03-605; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. Dignard & Maloney obs.

Utricularia minor L. — Circumboréal — Eaux peu profondes. Rare — 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney 03-539c.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord.

Rubiaceae

Galium labradoricum (Wieg.) Wieg. — Boréal nord-américain — Prairies riveraines, fens riverains. Rare — 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. *Dignard & Maloney 03-626a*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord.

Galium trifidum L. var. *trifidum* — Circumboréal — Bords de ruisseaux, rivages sablonneux. Peu fréquent — 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. *Dignard & Maloney 03-515*; 51°17'40,2"N.-60°12'55,0"O., côté ouest du lac Briçonnet, le long du ruisseau Kauepistetshi. *Dignard & Maloney 03-617*; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. *Dignard & Maloney 03-626*.

Galium triflorum Michx. — Circumboréal — Sous-bois, arbustives riveraines, rivages caillouteux. Assez fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-59; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan. *Maloney, Girard & Hébert 56*; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-12; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. *Dignard & Maloney 03-424*.

Caprifoliaceae

Diervilla lonicera P. Mill. — Tempéré nord-est américain — Rivages sablonneux, escarpements. Peu fréquent — 50°56'46,2"N.-61°37'15,3"O., rivière Natashquan, près de la sixième chute. *Maloney, Girard & Hébert 50*; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-108.

Linnaea borealis L. subsp. *americana* (Forbes) Hult. ex Clausen — Circumboréal — Sous-bois, arbustives riveraines, bords de ruisseaux. Assez fréquent — 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan. *Maloney, Girard & Hébert 64*; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Gagnon obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué. *Dignard & Maloney obs.*; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkunipiu. *Dignard & Maloney obs.*; 51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O., gorges de la rivière du Petit Mécatina, sommet du côté ouest. *Dignard & Maloney obs.*; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina. *Dignard & Maloney obs.*

Lonicera villosa (Michx.) J.A. Schultes — Boréal nord-américain — Bords de ruisseaux, brûlis, fens, tourbières ombrotrophes, arbustives riveraines. Peu fréquent — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O. Blondeau & Maloney obs.; 51°47'N.-61°19'O., au sud du lac Fonteneau (Lavoie, 1984); 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau. *Dignard & Maloney 03-493*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit. *Dignard & Maloney obs.*; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin. *Dignard & Maloney obs.*; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz. *Dignard & Maloney obs.*

Viburnum edule (Michx.) Raf. — Boréal nord-américain — Bords de ruisseaux, prairies et arbustives riveraines, sous-bois, escarpements. Assez fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 66; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°03'30,9"N.-61°33'17,4"O., Gagnon obs.; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Gagnon obs.; 51°43'56,0"N.-61°54'58,0"O., île sur la rivière Natashquan, 15 km en amont de la rivière Mahkuniu. Dignard & Maloney obs.; 51°22'32,5"N.-61°45'19,8"O., rivière Olomane, 9,5 km au nord-ouest du lac Lorens. Dignard & Maloney obs.; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat. Dignard & Maloney obs.; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux. Dignard & Maloney obs.

Viburnum nudum var. *cassinoides* (L.) Torr. & Gray [= *V. cassinoides* L.] — Tempéré nord-est américain — Sous-bois. Rare — 51°16"N.-61°20'O., lac Briçonnet (banque de données MENV).

Campanulaceae

Campanula rotundifolia L. — Circumboréal — Rivages caillouteux, berges rocheuses. Rare — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-61; 50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O., rivière Natashquan, près de l'intersection de la rivière avec sa branche ouest. Maloney, Girard & Hébert 47; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney 03-578.

Asteraceae

Achillea lanulosa Nutt. — Tempéré nord-américain — Rivages caillouteux ou sablonneux, arbustives riveraines. Peu fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan. Maloney, Girard & Hébert 2; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-69; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. Dignard & Maloney 03-434; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier. Dignard & Maloney 03-444.

Taxonomie selon Gervais (1977).

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. — Boréal nord-américain et asiatique — Rivages sablonneux. Peu fréquent — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-57; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan. Maloney, Girard & Hébert 11; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.

Artemisia campestris L. subsp. *borealis* (Pall.) Hall & Clements — Arctique-alpin circumpolaire à aire discontinue — Rivages sablonneux. Rare — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-51; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney obs.

Eupatorium maculatum L. — Boréal nord-américain — Rivages caillouteux ou sablonneux, arbustives riveraines. Rare — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-

70; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku. *Dignard & Maloney 03-432*.

Espèce non mentionnée par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Atteindrait sur le territoire sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (*cf.* Rousseau, 1974; Scoggan, 1978-1979; Meades *et al.*, 2000).

Eurybia radula (Ait.) Nesom [= *Aster radula* Ait.] — Boréal nord-est américain — Fens, tourbières ombrotrophes, arbustives et prairies riveraines, bords de ruisseaux. Assez fréquent — 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., *Blondeau & Maloney NAT02-16*; 51°50'45,2"N.-61°29'25,9"O., côté ouest du lac Fonteneau, *Dignard & Maloney 03-494*; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, *Dignard & Maloney obs.*; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, *Dignard & Maloney 03-526*; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, *Dignard & Maloney 03-583*; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, *Dignard & Maloney 03-627*.

Oclemena nemoralis (Ait.) Greene [= *Aster nemoralis* Ait.] — Boréal nord-est américain — Fens. Peu fréquent — 51°02'N.-61°12'O., lac Olivier (Lavoie, 1984); 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O., env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, *Dignard & Maloney 03-498, 03-499*; 51°13'17,5"N.-60°27'24,9"O., 7,5 km au sud du lac Cobaz, *Dignard & Maloney obs.*

Packera indecora (Greene) A. & D. Löve [= *Senecio indecorus* Greene] — Boréal nord-américain — Rivages caillouteux, prairies riveraines. Rare — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert 31*; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., *Blondeau & Maloney NAT02-24*.

Petasites frigidus (L.) Fries var. ***palmatus*** (Ait.) Cronq. [= *P. palmatus* (Ait.) Gray] — Boréal nord-américain et asiatique — Sous-bois, tourbières ombrotrophes, arbustives et prairies riveraines, bords de ruisseaux. Peu fréquent — 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert 90*; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., *Blondeau & Maloney obs.*; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, *Dignard & Maloney 03-516*; 51°29'42,0"N.-60°00'04,8"O., île sur la rivière du Petit Mécatina, 18,5 km en aval de l'embouchure de la rivière Mongeaux, *Dignard & Maloney obs.*

Solidago canadensis L. var. ***canadensis*** — Boréal nord-américain — Rivages caillouteux, arbustives riveraines. Peu fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert 34*; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., *Blondeau & Maloney NAT02-56, NAT02-62, NAT02-65, NAT02-116*; 51°04'06,9"N.-61°32'01,6"O., rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert 21*; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., *Blondeau & Maloney obs.*

Solidago macrophylla Pursh — Boréal nord-est américain — Sous-bois, arbustives, fens, rochers, colluvions. Assez fréquent — 50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O., *Blondeau & Maloney obs.*; 50°49'26,6"N.-61°42'07,7"O., rivière Natashquan, *Maloney, Girard & Hébert 12*; 51°38'43,1"N.-61°50'01,1"O., *Blondeau & Maloney NAT02-1*; 51°08'50,2"N.-61°24'00,2"O., sommet situé à env. 4 km au sud-est du lac Kapakustshuakamat, *Dignard & Maloney obs.*; 51°42'24,1"N.-61°52'29,4"O., sommet situé à 9,8 km à l'ouest du lac Kerdelhué, *Dignard & Maloney obs.*; 51°33'23,0"N.-60°27'37,9"O., rive ouest du lac Kahakauamat, *Dignard & Maloney obs.*; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la

rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.; 51°30'48,9"N.-59°57'44,1"O., montagne à l'est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

Solidago rugosa P. Mill. — Tempéré nord-est américain. Peu fréquent — Rivages sablonneux, arbustives riveraines. Rare — 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-71; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.

Atteindrait sur le territoire sa limite québécoise de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (*vide* Rousseau, 1974).

Solidago uliginosa Nutt. var. *linoides* (Torr. & Gray) Fern. [= *S. purshii* Porter] — Boréal nord-américain — Fens, rivages sablonneux, fens riverains. Peu fréquent — 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney NAT02-84; 51°04'52,6"N.-61°53'29,6"O., rive de la rivière Natashquan-Ouest, 2,5 km en amont du lac Cormier, Dignard & Maloney 03-440; 51°51'36,4"N.-61°11'21,0"O. env. 3 km au sud-sud-ouest du lac Kautshauakamit, Dignard & Maloney 03-508.

Symphyotrichum novi-belgii (L.) Nesom var. *novi-belgii* [= *Aster novi-belgii* L., *A. subspicatus* sensu Lavoie (1984)] — Boréal nord-est américain — Rivages caillouteux ou sablonneux, berges rocheuses, arbustives et prairies riveraines, bords de ruisseaux. Assez fréquent — 50°42'34,7"N.-61°38'00,5"O., rivière Natashquan, Maloney, Girard & Hébert 26, 33; 50°45'05,6"N.-61°38'30,2"O., Blondeau & Maloney NAT02-79; 50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°13'37,7"N.-61°24'23,6"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O., Blondeau & Maloney obs.; 51°24'46,3"N.-61°38'33,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-33, NAT02-44; 51°32'21,4"N.-61°51'11,5"O., Blondeau & Maloney NAT02-8; 51°41'54,5"N.-61°17'06,3"O., Blondeau & Maloney NAT02-18; 50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O., île sur la rivière Natashquan, 4,7 km en aval de l'embouchure de la rivière Akaku, Dignard & Maloney obs.; 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney obs.; 51°19'30,9"N.-59°49'22,6"O., rive est de la rivière du Petit Mécatina, Dignard & Maloney obs.

Symphyotrichum puniceum (L.) A. & D. Löve var. *puniceum* [= *Aster puniceus* L.] — Boréal nord-américain — Prairies riveraines. Peu fréquent — 51°28'49,1"N.-61°07'04,4"O., 5 km au sud-ouest des lacs Uhatshimin, Dignard & Maloney 03-523.

3.2 Analyse de la flore vasculaire

3.2.1 Répartition des taxons par famille

Les 241 taxons recensés sur le territoire étudié appartiennent à 58 familles. Les ptéridophytes comptent 25 taxons (10,4 %). Les gymnospermes comptent 6 taxons (2,4 %). Les angiospermes comprennent 210 taxons : 78 d'entre eux (32,4 %) sont des monocotylédones et 132 (54,8 %) des dicotylédones. Sept familles cumulent 50,2 % du nombre total des taxons. Les familles les mieux représentées sont les Cypéracées avec 37 taxons (15,3 %), les Poacées avec 19 taxons (7,8 %), les Éricacées avec 18 taxons (7,4 %), les Rosacées avec 13 taxons (5,9 %), les Astéracées avec 14

taxons (5,7 %), les Salicacées avec 11 taxons (4,5 %) et les Dryoptéridacées avec 9 taxons (3,6 %).

3.2.2 Spectre phytogéographique de la flore vasculaire

Les taxons recensés sur le territoire à l'étude sont regroupés selon leur appartenance à un domaine phytogéographique (tableau 2). Les taxons boréaux dominent nettement, avec 85,1 % du nombre total des espèces. Les taxons tempérés comptent pour 9,5 %, soit un peu moins de deux fois la proportion des espèces arctiques *s.l.* (4,6 %). Les espèces cosmopolites représentent une quantité négligeable avec seulement 0,8 % du total des taxons. Ces proportions sont presque identiques à celles observées par Blondeau *et al.* (2003) malgré de l'ajout de 57 taxons, soutenant davantage l'appartenance de la région au domaine boréal.

3.2.3 Additions, extensions et limites d'aire de répartition

Vingt-cinq espèces recensées sur le territoire n'étaient pas signalées par Lavoie (1984) pour la Moyenne et Basse-Côte-Nord (*Callitriche palustris*, *Cardamine pensylvanica*, *Carex debilis* var. *rudgei*, *C. projecta*, *C. utriculata*, *Cystopteris fragilis*, *Danthonia spicata*, *Dulichium arundinaceum*, *Equisetum palustre*, *E. scirpoides*, *Eupatorium maculatum*, *Galium labradoricum*, *Hudsonia tomentosa*, *Isoetes echinospora*, *Juncus pelocarpus*, *J. subtilis*, *Mentha arvensis*, *Poa glauca*, *Poa pratensis*, *Potamogeton richardsonii*, *Ranunculus aquatilis* var. *diffusus*, *R. pensylvanicus*, *Scutellaria lateriflora*, *Utricularia minor* et *Vaccinium boreale*). Onze taxons atteignent sur le territoire leur limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (tableau 3). Trois d'entre eux constituent des additions à la flore de la Côte-Nord (à l'est de Tadoussac) : *Carex debilis* var. *rudgei* (fide Rousseau, 1974; Scoggan, 1978-1979), *Isoetes echinospora* (fide Fleurbec, 1993) et *Scutellaria lateriflora* (fide Rousseau, 1974; Fleurbec, 1987). Deux autres de ces ajouts dépendent probablement de changements taxonomiques : *Carex utriculata* était autrefois traité comme une variété du *C. rostrata* et *Vaccinium boreale* comme une variété du *V. angustifolium*.

Tableau 2 Spectre phytogéographique de la flore vasculaire du territoire du projet de parc de Natashquan-Agvanus-Kenamu

Domaine phytogéographique	Nombre de taxons	% par domaine
Boréal		
Circumboréal	85	35,3
Boréal nord-américain	72	29,9
Boréal nord-est américain	31	12,9
Boréal nord-américain et asiatique	14	5,8
Boréal amphi-atlantique	2	0,8
Boréal cordillérien	1	0,4
Total	205	85,1
Tempéré		
Circumtempéré	1	0,4
Tempéré nord-est américain	17	7,0
Tempéré nord-américain	4	1,7
Tempéré nord-est américain et est-asiatique	1	0,4
Total	23	9,5
Arctique sensu lato		
Circumpolaire	3	1,2
Arctique-alpin circumpolaire	5	2,5
Arctique-alpin amphi-atlantique	3	1,2
Total	11	4,6
Cosmopolite	2	0,8
Total général	241	100

Tableau 3 Taxons atteignant sur le territoire leur limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador

Taxon	Nouvelle limite vers le nord-est au Québec/Labrador	Sources
<i>Carex debilis</i> var. <i>rudgei</i>	51°15'38,6"N.-60°58'30,3"O.	Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979); Meades <i>et al.</i> (2000)
<i>Carex houghtoniana</i>	50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O.	Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979); Lavoie (1984); Meades <i>et al.</i> (2000)
<i>Dulichium arundinaceum</i>	50°53'51,4"N.-61°40'04,0"O.	Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979); Fleurbec (1987); Meades <i>et al.</i> (2000); Mastrogiuseppe (2002)
<i>Eupatorium maculatum</i>	50°46'02,0"N.-61°39'29,0"O.	Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979); Meades <i>et al.</i> (2000)
<i>Ilex mucronata</i>	51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O.	Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979); Lavoie (1984); Meades <i>et al.</i> (2000)
<i>Matteucia struthiopteris</i>	50°45'32,2"N.-61°38'12,9"O.	Rousseau (1974); Lavoie (1984); Cody et Britton (1989); Fleurbec (1993); Johnson (1993); Meades <i>et al.</i> (2000)
<i>Melampyrum lineare</i>	51°25'33,1"N.-61°40'55,0"O.	Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979); Lavoie (1984); Meades <i>et al.</i> (2000)
<i>Potamogeton richardsonii</i>	51°19'29,9"N.-59°49'25,7"O.	Haynes et Hellquist (2000); Meades <i>et al.</i> (2000)
<i>Pteridium aquilinum</i>	51°20'19,5"N.-59°51'31,5"O.	Rousseau (1974); Lavoie (1984); Cody et Britton (1989); Fleurbec (1993); Meades <i>et al.</i> (2000)
<i>Scutellaria lateriflora</i>	51°18'22,1"N.-61°41'55,4"O.	Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979); Meades <i>et al.</i> (2000); Fleurbec (1987)
<i>Solidago rugosa</i>	50°54'25,0"N.-61°41'33,1"O.	Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979); Lavoie (1984); Meades <i>et al.</i> (2000)

3.2.4 Taxons rares à l'échelle du territoire étudié

Des 241 taxons recensés sur le territoire, 42 peuvent être considérés comme rares ou relativement rares sur le territoire puisqu'ils n'ont été observés ou récoltés qu'en un ou deux endroits au cours des inventaires. Il s'agit de :

<i>Anthoxanthum hirtum</i> subsp. <i>arcticum</i>	<i>Melampyrum lineare</i>
<i>Anthoxanthum monticolum</i> subsp. <i>monticolum</i>	<i>Mentha arvensis</i>
<i>Arctostaphylos alpina</i>	<i>Mitella nuda</i>
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i>	<i>Monotropa hypopithys</i>
<i>Carex chordorrhiza</i>	<i>Muhlenbergia uniflora</i>
<i>Carex debilis</i> var. <i>rudgei</i>	<i>Myriophyllum tenellum</i>
<i>Carex houghtoniana</i>	<i>Packera indecora</i>
<i>Cystopteris fragilis</i>	<i>Piptatherum canadense</i>
<i>Diapensia lapponica</i>	<i>Poa glauca</i>
<i>Drosera anglica</i>	<i>Poa pratensis</i>
<i>Dulichium arundinaceum</i>	<i>Polypodium virginianum</i>
<i>Epigaea repens</i>	<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>
<i>Equisetum palustre</i>	<i>Ranunculus aquatilis</i> var. <i>diffusus</i>
<i>Equisetum scirpoides</i>	<i>Ranunculus pensylvanicus</i>
<i>Eriophorum tenellum</i>	<i>Sorbus americana</i>
<i>Eriophorum virginicum</i>	<i>Taxus canadensis</i>
<i>Eupatorium maculatum</i>	<i>Utricularia cornuta</i>
<i>Galium labradoricum</i>	<i>Utricularia minor</i>
<i>Hudsonia tomentosa</i>	<i>Vaccinium ovalifolium</i>
<i>Juncus pelocarpus</i>	<i>Viburnum nudum</i> var. <i>cassinoides</i>
<i>Juncus trifidus</i>	<i>Woodsia ilvensis</i>

3.2.5 Taxons arctiques-alpins

Neuf taxons arctiques-alpins sont présents sur le territoire, *Carex bigelowii* se rencontre autant sur les sommets dénudés que sur les platières de certaines rivières. *Arctostaphylos alpina* et *Diapensia lapponica* sont probablement présents sur la plupart des hauts sommets dénudés. *Cystopteris fragilis* et *Poa glauca* n'ont été rencontrés que sur un seul sommet un peu à l'est de la rivière Natashquan. *Juncus trifidus* et *Racomitrium lanuginosum* n'ont été observés que sur un des sommets des gorges de la rivière du Petit Mécatina. *Dryopteris fragrans*, rencontré à deux reprises, est probablement occasionnel sur les parois rocheuses et dans les talus d'éboulis exposés. *Artemisia campestris* subsp. *borealis* fréquente les sables des platières des rivières. Il est probablement disséminé sur le territoire.

3.2.6 Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

Un seul taxon recensé dans les limites du territoire étudié est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec. Il s'agit de *Hudsonia tomentosa*.

***Hudsonia tomentosa* Nuttall**

hudsonie tomenteuse

Cistaceae

Rang de priorité au Québec : S3¹

Habitat : Sables éoliens, dunes.

Répartition : Boréale nord-américaine; sporadique au Québec. Depuis la Caroline du Nord et du Dakota du Nord jusqu'en Alberta, au Labrador et au Maine. Au Québec, la plante est connue que d'une soixantaine d'occurrences (Abitibi, Outaouais, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, Jamésie) (Labrecque et Lavoie, 2002; Petitclerc et Dignard, 2004). Deux occurrences dans le territoire étudié. Environ 1000 individus au total (figures 2 et 3).




Figure 2 *Hudsonia tomentosa* (tirée de Britton et Brown, 1913).




Figure 3 Répartition de *Hudsonia tomentosa* au Québec (CDPNQ et Petitclerc et Dignard, 2004).

¹ S3 correspond au rang de priorité attribué selon la méthodologie de l'organisme américain *The Nature Conservancy*. Le rang S3 signifie que le taxon est rare ou peu fréquent au Québec.

3.3 Principaux secteurs d'intérêt identifiés sur le territoire

Le tableau 4 présente les sites d'échantillonnage abritant des éléments d'intérêt et dont la protection est souhaitable. Ces sites sont cartographiés à la figure 4. Cette figure montre aussi la localisation d'habitats potentiels pour au moins trois espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec, soit *Arethusa bulbosa*, *Carex glacialis* et *Hudsonia tomentosa*, dont la probabilité de rencontre est assez élevée dans la région. La présence de deux taxons calcicoles (*Cystopteris fragilis* et *Poa glauca*) sur le versant d'un sommet situé à environ 10 km au sud du lac Le Doré pourrait être reliée à la présence de calcium dans les gabbros à clinopyroxène du lac Le Doré.

Tableau 4 Éléments remarquables des sites d'intérêt identifiés pour la flore vasculaire

Site ¹	Élément(s) d'intérêt
2	Une espèce rare à l'échelle du territoire : <i>Packera indecora</i> .
5	Une population d'espèce à sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador : <i>Dulichium arundinaceum</i> .
6	Deux espèces rares à l'échelle du territoire : <i>Polypodium virginianum</i> et <i>Woodsia ilvensis</i> .
9	Une population d'espèce à sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador (<i>Eupatorium maculatum</i>) et quatre espèces rares à l'échelle du territoire étudié (<i>Anthoxanthum hirtum</i> subsp. <i>arcticum</i> , <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i> , <i>Equisetum scirpoides</i> et <i>Taxus canadensis</i>)
10	Une population d'espèce à sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador : <i>Carex houghtonii</i> .
11	Une espèce rare à l'échelle du territoire : <i>Woodsia ilvensis</i> .
14	Une espèce rare à l'échelle du territoire : <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i> .
18	Sommet dénudé, alt. 547 m. Une espèce arctique-alpine : <i>Arctostaphylos alpina</i> .
19	Une espèce rare à l'échelle du territoire : <i>Packera indecora</i> .
20	Sommet dénudé, alt. 425 m. Deux espèces arctiques-alpines (<i>Arctostaphylos alpina</i> et <i>Carex bigelowii</i>) et deux espèces calcicoles rares à l'échelle du territoire (<i>Cystopteris fragilis</i> et <i>Poa glauca</i>).
21	Une population d'espèce à sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador : <i>Eupatorium maculatum</i> .
27	Sommet dénudé, alt. 610 m. Trois espèces arctiques-alpines : <i>Arctostaphylos alpina</i> , <i>Carex bigelowii</i> et <i>Diapensia lapponica</i> .
29	Deux espèces rares à l'échelle du territoire : <i>Muhlenbergia uniflora</i> et <i>Juncus pelocarpus</i> .
33	Une population d'espèce à sa limite de répartition vers le nord-est au Québec/Labrador : <i>Carex debilis</i> var. <i>rudgei</i> .
41	Sommet dénudé, alt. 450 m. Cinq espèces arctiques-alpines : <i>Anthoxanthum monticolum</i> , <i>Arctostaphylos alpina</i> , <i>Carex bigelowii</i> , <i>Diapensia lapponica</i> et <i>Juncus trifidus</i> .
44	Population d'espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec : <i>Hudsonia tomentosa</i> .
45	Population d'espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec : <i>Hudsonia tomentosa</i> .

¹ La numérotation des sites correspond à celle du tableau 1.

Figure 4

Sites d'échantillonnage comportant des éléments floristiques d'intérêt et habitats potentiels d'espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables



Site comportant des espèces rares à l'échelle du territoire et/ou atteignant dans la région leur limite de répartition vers l'est ou le nord au Québec



Site comportant une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec (*Hudsonia tomentosa*)



Habitat potentiel d'espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec (*Hudsonia tomentosa*, *Carex glacialis* et *Arctostaphylos ulmaria*)



Dépôts éoliens et dunes



Matériaux fluvo-glaciaires, surtout eskers




Tourbières

Projet d'aire protégée de la rivière Natashquan

Projet de parc Aguanus-Kenamu



Ressources
naturelles,
Faune et Parcs
Québec



Conclusion et recommandations

Les inventaires menés en 2002 et 2003 auront permis d'établir un premier portrait de la flore vasculaire du territoire du projet de parc Natashquan-Aguanau-Kenamu. Le nombre de taxons recensés s'élève à 241, ce qui doit représenter environ 75% du nombre total de taxons présents sur le territoire. L'analyse floristique, basée sur les taxons de la liste annotée, corrobore le caractère résolument boréal (85 %) de la région explorée. Vingt-cinq espèces recensées sur le territoire n'étaient pas signalées par Lavoie (1984) pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Trois d'entre elles constituent des additions à la flore de la Côte-Nord (à l'est de Tadoussac). Onze taxons atteignent sur le territoire leur limite de répartition vers le nord ou le nord-est. Un autre taxon, repéré sur deux sites, est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec (*Hudsonia tomentosa*). La présence de neuf taxons arctiques-alpins sur le territoire a aussi été notée.

Compte tenu du petit nombre anticipé de visiteurs au parc et du peu d'impact prévisible de cette fréquentation sur la végétation et la flore, nous considérons que les précautions et les normes usuelles en terme de conservation des ressources dans les parcs du Québec peuvent s'appliquer. Afin d'assurer la protection de certains éléments sensibles ou inusités et d'accroître le niveau des connaissances sur la flore du parc, nous formulons les recommandations suivantes:

- inclure dans les limites du parc les sommets à végétation de type subarctique situés du côté ouest de la rivière du Petit-Mécatina à la hauteur des gorges;
- conserver à l'intérieur des limites du parc le secteur de dunes situé au sud du lac Hakluyt afin de préserver par un zonage approprié les populations d'udsonie tomenteuse, une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, et vérifier sa présence dans des habitats similaires situés ailleurs sur le territoire
- limiter ou baliser l'accès aux sommets supportant des espèces arctiques-alpines. La couverture végétale de ces sommets est fragile et extrêmement sensible au piétinement;
- procéder éventuellement à l'inventaire des bryophytes et des lichens ou en favoriser la réalisation;
- poursuivre l'inventaire de la flore vasculaire, notamment dans les habitats peu ou pas assez inventoriés au cours des campagnes de 2002 et 2003.

Remerciements

L'auteur remercie Jean Boisclair et Raymonde Pomerleau de la Direction des parcs du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP) qui ont pourvu à l'organisation et à la logistique de la campagne de terrain et Andrée Michaud de la Direction de la recherche forestière (MRNFP) pour le traitement des récoltes et l'édition d'une partie du texte. Merci également à André Lafrenière de la Direction générale de l'information géographique (MRNFP) pour la réalisation des figures 1 et 4.

Références

- BARON-LAFRENIÈRE, L., 2003. Projet de parc de Natashquan-Agwanus-Kenamu. Étude du milieu physique. Rapport interne préliminaire produit pour la Société de la faune et des parcs du Québec, Direction de la planification et du développement des parcs, Québec, 60 pages + cartes.
- BLONDEAU, M., MALONEY, A. et J. GAGNON, 2003. Exploration botanique de la vallée de la rivière Natashquan entre le 50°40'N. et 51°12'N., Côte-Nord, Québec. Notices floristiques n°6. Ministère des Ressources naturelles, Forêt Québec, Direction de la recherche forestière, Herbier du Québec, 28 p.
- BRITTON, N. L. et A. BROWN, 1913. An illustrated flora of the Northern United States and Canada, 3 volumes, Réimprimé en 1970, Dover Publications, New York, 2052 p.
- BROOKS, R.E. et S.E. CLEMANTS, 2000. *Juncus* Linnaeus, Pages 211-255 dans Flora of North America Editorial Committee, éd. Flora of North America. Volume 22. Magnoliophyta : Alismatidae, Arecidae, Commelinidae (in part), and Zingiberidae. Oxford University Press, New York, 352 p.
- CODY, W.J., 1996. Flora of the Yukon Territory. NRC Research Press, Ottawa, 643 p.
- DARBYSHIRE, S.J., 2003. *Danthonia* DC. Pages 301-306 dans Flora of North America Editorial Committee, éd. Flora of North America, Volume 25. Magnoliophyta : Commelinidae (in part) : Poaceae, part 2. Oxford University Press, New York, 783 p.
- FERNALD, M.L., 1950. Gray's Manual of Botany. 8th ed. American Book Co., New York, 1632 p.
- FLEURBEC, 1987. Plantes sauvages des lacs, rivières et tourbières. Guide d'identification Fleurbec, Fleurbec auteur et éditeur, Saint-Augustin (Portneuf), Québec, 399 p.
- FLEURBEC, 1993. Fougères, prêles et lycopodes. Guide d'identification Fleurbec, Fleurbec auteur et éditeur, Saint-Henri-de-Lévis, Québec, 512 p.
- FLORA OF NORTH AMERICA, 2002. Site Web (<http://huh.harvard.edu/Flora/>).
- FNAEC (FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE), 1993. Flora of North America. Volume 2. Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York, 475 p.
- FNAEC (FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE), 1997. Flora of North America. Volume 3. Magnoliophyta: Magnoliidae and Hamamelidae. Oxford University Press, New York, 590 p.
- FNAEC (FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE), 2000. Flora of North America. Volume 22. Magnoliophyta : Alismatidae, Arecidae, Commelinidae (in part) and Zingiberidae. Oxford University Press, New York, 352 p.
- FNAEC (FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE), 2002. Flora of North America. Volume 23. Magnoliophyta: Commelinidae (in part): Cyperaceae. Oxford University Press, New York, 608 p.
- FNAEC (FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE), 2002a. Flora of North America. Volume 26. Magnoliophyta: Liliidae : Liliales and Orchidales. Oxford University Press, New York, 723 p.

- FNAEC (FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE), 2003. Flora of North America. Volume 25. Magnoliophyta : Commelinidae (in part) : Poaceae, part 2. Oxford University Press, New York. 783 p.
- GERVAIS, C., 1977. Cytological investigation of the *Achillea millefolium* complex (Compositae) in Québec. Can. J. Bot. 55 : 796-808.
- GERVAIS, C. et M. PARENT, 2003. Le *Menyanthes trifoliata* Linnaeus subsp. *verna* (Rafinesque) *comb. nova* (Gentianaceae), dans l'est de l'Amérique du Nord. Ludoviciana 31 : 14-21.
- HAUKE, R. L., 1993. Equisetaceae. *Equisetum*. Pages 76-84 dans Flora of North America Editorial Committee, éd. Flora of North America. Volume 2. Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York. 475 p.
- HAYNES, R.R. et C.B. HELLQUIST, 2000. Potamogetonaceae Dumortier. Pages 47-74 dans Flora of North America Editorial Committee, éd. Flora of North America. Volume 22. Magnoliophyta : Alismatidae, Arecidae, Commelinidae (in part), and Zingiberidae. Oxford University Press, New York. 352 p.
- HAUFLER, C.H., R.C. MORAN et M.D. WINDHAM, 1993. *Cystopteris Bernhardtii*. Pages 263-270 dans Flora of North America Editorial Committee, éd. Flora of North America. Volume 2. Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York. 475 p.
- HENDERSON, N.C., 2002. *Iris* Linnaeus. Pages 371-395 dans Flora of North America Editorial Committee, éd. Flora of North America. Volume 26. Magnoliophyta : Liliidae : Liliales and Orchidales. Oxford University Press, New York. 723 p.
- HOLMGREN, P.K., N.H. HOLMGREN et L.C. BARNETT, 1990. *Index Herbariorum*. Part I : The Herbaria of the World. New York Botanical Garden, New York. 693 p.
- HOUE, A., 1978. Atlas climatologique du Québec. Température - précipitation. Québec. Service de la météorologie. Ministère des Richesses Naturelles. Direction générale des eaux. M-36, 42 planches.
- HULTÉN, E., 1968. Flora of Alaska and neighboring territories. Stanford University Press, Stanford, California. 1008 p.
- JOHNSON, D.M., 1993. *Matteucia Todaro*. Pages 249-250 dans Flora of North America Editorial Committee, éd. Flora of North America. Volume 2. Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York. 475 p.
- KARTESZ, J.T. et C.A. MEACHAM, 1999. Synthesis of the North American Flora, CD-ROM Version 1.0, North Carolina Botanical Garden, Chapel Hill, NC.
- LABRECQUE J. et G. LAVOIE, 2002. Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec. Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et du développement durable, Québec. 200 p.
- LAVOIE, G., 1984. Contribution à la connaissance de la flore vasculaire et invasculaire de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord, Québec/Labrador. Provancheria n° 17 : 1-149.
- MALONEY, A., HÉBERT, A. et COLL., 2002. Projet de parc Natashquan-Aguanus-Kenamu. Rapport de la première campagne de terrain. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction de la planification et du développement des parcs. Document non-publié. 20 p. + annexes.

- MASTROGIUSEPPE, J., 2002. *Dulichium* Persoon, Pages 198 dans *Flora of North America* Editorial Committee, éd. *Flora of North America*. Volume 23. Magnoliophyta : Commelinidae (in part) : Cyperaceae. Oxford University Press, New York. 608 p.
- MEADES, S.J., S.G. HAY et L. BROUILLET, 2000. Annotated checklist of the vascular plants of Newfoundland and Labrador (<http://www.nfmuseum.com/meades.htm>).
- MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE, 1986. Les Parcs québécois. 7. Les régions naturelles. Gouvernement du Québec, Direction générale du plein air et des parcs, Québec. 257 pages + carte.
- PAYETTE, S. et E. LEPAGE, 1977. La flore vasculaire du golfe de Richmond, baie d'Hudson, Nouveau-Québec. *Provancheria* n° 7, 68 p.
- PETITCLERC, P. et N. DIGNARD, 2004. La situation de la hudsonie tomenteuse (*Hudsonia tomentosa*) au Québec. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, rapport préparé pour le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, ministère de l'Environnement 23 p.
- PORSILD, A.E. et W.J. CODY, 1980. Vascular plants of continental Northwest Territories. National Museum of Natural Sciences, Ottawa. 667 p.
- POWELL, M., V. SAVOLAINEN, P. CUÉNOUD, J.-F. MANEN et S. ANDREWS. 2000. The mountain holly (*Nemopanthus mucronatus*: Aquifoliaceae) revisited with molecular data. *Kew Bulletin* 55 (2) : 341-347.
- PROULX, H., G. JACQUES, A.-M. LAMOTHE et J. LITYNSKI. 1987. Climatologie du Québec méridional. Ministère de l'Environnement du Québec, Direction de la météorologie, M. P. 65. 198 p.
- ROUSSEAU, C., 1974. Géographie floristique du Québec-Labrador, Distribution des principales espèces vasculaires. — Travaux et documents du Centre d'études nordiques n° 7. Les Presses de l'Université Laval, Québec. 799 p.
- SCOGGAN, H.J., 1978-1979. The Flora of Canada. National Museums of Canada, National Museum of Natural Sciences, Publications in Botany n° 7, Ottawa. 1711 p.
- TAYLOR W. C., N. T. LUEBKE, D. M. BRITTON, R. J. HICKEY & D. F. BRUNTON, 1993. *Isoetaceae* Reichenbach. Pages 64-75 dans *Flora of North America* Editorial Committee, éd. *Flora of North America*. Volume 2. Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York. 475 p.
- USDA/NRCS, 2002. Site Web The national PLANTS database (<http://plants.usda.gov/>).
- UTECH, F.H., 2002. *Streptopus* Michaux, Pages 145-147 dans *Flora of North America* Editorial Committee, éd. *Flora of North America*. Volume 26. Magnoliophyta : Liliidae : Liliales and Orchidales. Oxford University Press, New York. 723 p.
- WILSON, C. V. 1971. Le climat du Québec en deux parties. Première partie : Atlas climatique. Service météorologique du Canada, Études climatiques n° 11, Ottawa. 44 figures.
- WHITTEMORE, A.T., 2002. *Ranunculus* Linnaeus. Pages 88-135 dans *Flora of North America* Editorial Committee, éd. *Flora of North America*. Volume 3. Magnoliophyta : Magnoliidae and Hamamelidae. Oxford University Press, New York. 590 p.

Annexes

Annexe 1 **Liste alphabétique des taxons de la flore vasculaire du territoire du projet de parc Natashquan-Aguanus-Kenamu**

- Abies balsamea* (L.) P. Mill.
Acer spicatum Lam.
Achillea lanulosa Nutt.
Actaea rubra (Ait.) Willd.
Agrostis mertensii Trin. subsp. *borealis* (Hartm.) Tzvelev
Agrostis scabra Willd.
Alnus incana (L.) Moench subsp. *rugosa* (Du Roi) Clausen
Alnus viridis (Vill.) Lam. & DC. subsp. *crispa* (Ait.) Turrill
Amelanchier bartramiana (Tausch) Roemer
Anaphalis margaritacea (L.) Benth.
Andromeda polifolia L. var. *glaucophylla* (Link) DC.
Anthoxanthum monticolum (Bigel.) Veldkamp subsp. *monticolum*
Anthoxanthum hirtum (Schränk) Y. Schouten & Veldkamp subsp. *arcticum* (J. Presl) G.C. Tucker
Aralia hispida Vent.
Aralia nudicaulis L.
Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Artemisia campestris L. subsp. *borealis* (Pall.) Hall & Clements
Athyrium filix-femina Roth subsp. *angustum* (Willd.) Clausen
Betula cordifolia Regel
Betula glandulosa Michx.
Betula michauxii Spach
Betula minor (Tuck.) Fern.
Betula papyrifera Marsh. s.l.
Betula pumila L. var. *glandulifera* Regel
Bromus ciliatus L.
Calamagrostis canadensis (Michx.) Beauv. s.l.
Calamagrostis stricta (Timm) Koel. subsp. *stricta*
Callitriche palustris L.
Campanula rotundifolia L.
Cardamine pensylvanica Muhl. ex Willd.
Carex aquatilis Wahl. var. *aquatilis*
Carex bigelowii Torr. ex Schwein.
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
Carex canescens L.
Carex chordorrhiza Ehrh. ex L. f.
Carex debilis Michx. var. *rudgei* Bailey
Carex deflexa Hornem.
Carex disperma Dewey
Carex echinata Murr.
Carex exilis Dewey
Carex foenea var. *foenea* Willd.
Carex houghtoniana Torr. ex Dewey
Carex intumescens Rudge
Carex lenticularis Michx.
Carex limosa L.
Carex livida (Wahl.) Willd.
Carex magellanica Lam. subsp. *irrigua* (Wahl.) Hult.
Carex oligosperma Michx.
Carex pauciflora Lightf.
Carex projecta Mackenzie
Carex rostrata Stokes
Carex saxatilis L.
Carex trisperma Dewey
Carex utriculata Boott
Carex vesicaria L.
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
Chamerion angustifolium (L.) Holub
Chamerion latifolium (L.) Holub
Cicuta bulbifera L.
Cinna latifolia (Trev. ex Goepp.) Griseb
Circaea alpina L.
Clintonia borealis (Ait.) Raf.
Comarum palustre L.
Coptis trifolia (L.) Salisb.
Cornus canadensis L. s.l.
Cornus sericea L. subsp. *sericea*
Cystopteris fragilis (L.) Bernh
Danthonia spicata (L.) Beauv. ex Roemer & J.A. Schultes
Deschampsia flexuosa (L.) Trin
Diapensia lapponica L. var. *lapponica*
Diervilla lonicera P. Mill.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Diphasiastrum xabinifolium (Willd.) Holub
Drosera anglica Huds.
Drosera rotundifolia L.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Dryopteris expansa (K. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy

Dryopteris fragrans (L.) Schott
Dulichium arundinaceum (L.) Britt.
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex
 Shinnery
Empetrum nigrum L. subsp.
hermaphroditum (Lange ex Hagerup)
 Böcher
Epigaea repens L.
Epilobium ciliatum Raf. subsp. *ciliatum*
Epilobium palustre L.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum palustre L.
Equisetum scirpoides Michx.
Equisetum sylvaticum L.
Eriophorum angustifolium Honckeny
Eriophorum russeolum Fries ex Hartm.
 subsp. *russeolum*
Eriophorum tenellum Nutt.
Eriophorum vaginatum L. subsp. *spissum*
 (Fern.) Hult.
Eriophorum virginicum L.
Eriophorum viridicarinatum (Engelm.)
 Fern.
Eupatorium maculatum L.
Eurybia radula (Ait.) Nesom
Galium labradoricum (Wieg.) Wieg.
Galium trifidum L. var. *trifidum*.
Galium triflorum Michx.
Gaultheria hispidula (L.) Muhl. ex Bigel.
Gentiana linearis Froel.
Geocaulon lividum (Richards.) Fern.
Glyceria canadensis (Michx.) Trin
Goodyera repens (L.) R. Br. ex Ait. f.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Hippuris vulgaris L.
Hudsonia tomentosa Nutt.
Huperzia lucidula (Michx.) Trevisan
Huperzia selago Bernh. ex Mart. & Schrank
 s.l.
Ilex mucronata (L.) Powell
Iris versicolor L.
Isoetes echinospora Durieu
Juncus brevicaudatus (Engelm.) Fern.
Juncus filiformis L.
Juncus pelocarpus E. Mey.
Juncus stygius L. subsp. *americanus* (Buch.)
 Hult.
Juncus subtilis E. Meyer
Juncus trifidus L.
Juniperus communis L. var. *depressa* Pursh
Kalmia angustifolia L.
Kalmia polifolia Wangenh.
Larix laricina (Du Roi) K. Koch
Ledum groenlandicum Oeder
Linnaea borealis L. subsp. *americana*
 (Forbes) Hult. ex Clausen
Listera cordata (L.) R. Br. ex Ait. f.
Lonicera villosa (Michx.) J.A. Schultes
Lycopodium annotinum L.
Lycopodium clavatum L. s.l
Lycopodium dendroideum Michx.
Lycopus uniflorus Michx.
Lysimachia terrestris (L.) B.S.P.
Maianthemum canadense Desf.
Maianthemum trifolium (L.) Sloboda
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
Melampyrum lineare Desr.
Menyanthes trifoliata L. subsp. *verna* (Raf.)
 Gervais & Parent
Mentha arvensis L.
Mitella nuda L.
Moneses uniflora (L.) Gray
Monotropa hypopithys L.
Monotropa uniflora L.
Muhlenbergia uniflora (Muhl.) Fern
Myrica gale L.
Myriophyllum tenellum Bigelow
Nuphar lutea (L.) Sm. subsp. *variegata*
 (Dur.) E.O. Beal
Oclemena nemoralis (Ait.) Greene
Onoclea sensibilis L.
Orthilia secunda (L.) House
Osmunda claytoniana L.
Oxalis montana Raf.
Packera indecora (Greene) A. & D. Löve
Petasites frigidus (L.) Fries var. *palmatus*
 (Ait.) Cronq.
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Picea glauca (Moench.)
Picea mariana (P. Mill.) B.S.P
Piptatherum canadense (Poir.) Barkworth
Platanthera obtusata (Banks ex Pursh)
 Lindl.
Poa glauca M. Vahl
Poa pratensis L. s.l.
Polypodium virginianum L.
Populus balsamifera L.
Populus tremuloides Michx.
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton richardsonii (Benn.) Rydb
Potentilla norvegica L.
Prunus pensylvanica L. f.

- Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var.
latiusculum (Desv.) Underwood ex
Heller
Ranunculus aquatilis L. var. *diffusus* With.
Ranunculus flammula L. var. *filiformis*
(Michx.) Hook.
Ranunculus pensylvanicus L. f.
Rhododendron canadense (L.) Torr.
Ribes glandulosum Grauer
Ribes lacustre (Pers.) Poir.
Ribes triste Pallas
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Rubus acaulis Michx.
Rubus chamaemorus L.
Rubus idaeus L. subsp. *strigosus* (Michx.)
Focke
Rubus pubescens Raf.
Sagittaria cuneata Sheldon
Salix argyrocarpa Anderss.
Salix bebbiana Sarg.
Salix cordata Michx.
Salix humilis Marsh.
Salix lucida Muhl.
Salix pedicellaris Pursh
Salix pellita (Anderss.) Anderss. ex Schneid.
Salix planifolia Pursh
Salix pyrifolia Anderss.
Sanguisorba canadensis L.
Sarracenia purpurea L.
Sibbaldiopsis tridentata (Ait.) Rydb.
Subularia aquatica L. var. *americana*
(Mulligan & Calder) Boivin
Scheuchzeria palustris L.
Schizachne purpurascens (Torr.) Swallen
Scirpus atrocinctus Fern.
Scirpus microcarpus J. & K. Presl
Scutellaria galericulata L.
Scutellaria lateriflora L.
Solidago canadensis L. var. *canadensis*
Solidago macrophylla Pursh
Solidago rugosa P. Mill.
Solidago uliginosa Nutt. var. *linoides*
(Torr. & Gray) Fern.
Sorbus americana Marsh.
Sorbus decora (Sarg.) Schneid.
Sparganium emersum Rehmman
Sparganium hyperboreum Laestad.
Spiraea alba Du Roi var. *latifolia* (Ait.)
Dippel *Streptopus amplexifolius* (L.)
DC. var. *amplexifolius*
Streptopus lanceolatus (Ait.) Reveal var.
lanceolatus.
Symphyotrichum novi-belgii (L.) Nesom var.
novi-belgii
Symphyotrichum puniceum (L.) A. & D.
Löve var. *puniceum*
Taxus canadensis Marsh
Thalictrum pubescens Pursh
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.
Trientalis borealis Raf.
Triglochin maritimum L.
Trisetum spicatum (L.) Richter
Utricularia cornuta Michx.
Utricularia intermedia Hayne
Utricularia macrorhiza Le Conte
Utricularia minor L.
Vaccinium angustifolium Ait.
Vaccinium boreale Hall & Aalders
Vaccinium caespitosum Michx.
Vaccinium myrtilloides Michx.
Vaccinium ovalifolium Sm.
Vaccinium oxycoccus L.
Vaccinium uliginosum L.
Vaccinium vitis-idaea L. subsp. *minus*
(Lodd.) Hult.
Vahlodea atropurpurea (Wahl.) Fries ex
Hartm.
Veronica scutellata L.
Viburnum edule (Michx.) Raf.
Viburnum nudum var. *cassinoides* (L.) Torr.
& Gray
Viola blanda Willd. var. *palustriformis* Gray
Viola labradorica Schrank
Viola macloskeyi Lloyd subsp. *pallens*
(Banks ex Ging) M.S. Baker
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.



Photo 1. *Arctostaphylos alpina* (sommet ouest des gorges de la rivière du Petit Mécatina).



Photo 2. *Diapensia lapponica* (sommet à 9 km au sud du lac Kerdellhué).



Photo 3. *Hudsonia tomentosa* (5,8 km au sud du lac Hakluyt).



Photo 4. Habitat d'*Hudsonia tomentosa* (dunes de la rivière du Petit Mécatina, 10 km au sud du lac Hakluyt).



*Ressources
naturelles,
Faune et Parcs*

Québec 