

CARTE PHYTO-DYNAMIQUE DU COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP QUÉBEC

ÉCHELLE 1:50 000

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MINISTÈRE DES TERRES ET FORÊTS
SERVICE DE LA RECHERCHE

Cette carte fait partie de la série no 4, Service de la recherche du ministère des Terres et Forêts, et d'une série de documents présentée à l'École des Géologues de l'université Laval, par Jean Louis Blais, sous la direction de Dr. Monique M. Gauthier, département d'Ecologie et de Phytologie, Institut de l'Environnement et de Géologie, et (intitulé) : Étude écologique et cartographique de la végétation du comté de Rivière-du-Loup.

Cette carte a été établie en 1970 au moyen de l'interprétation des photographies aériennes prises en 1965 à l'échelle approximative de 1:15 000. Les masses de terrain ont été effectuées de 1965 à 1967. Elle a été préparée pour publication en 1973 par le Service de la Cartographie du ministère des Terres et Forêts.

- VÉGÉTATION MARITIME**
 - Sables côtiers
 - Littoral rudéral
 - Plaines maritimes terres abandonnées
- VÉGÉTATION FORESTIÈRE ET AGRICOLE**
 - SÉRIE DE LA PESSIÈRE À KALMIA ET CLADONIE**
 - Pessière à kalmia et cladonie
 - Pineuse grise
 - SÉRIE DE LA PESSIÈRE À KALMIA ET CALLIERSON**
 - Pessière à kalmia et callieron
 - Tremblée en pinette grise
 - Lande à kalmia
 - Terres abandonnées
 - SÉRIE DE LA PESSIÈRE BLANCHE À THUYA**
 - Pessière blanche à thuya terres cultivées
 - SÉRIE DE LA SAPINIÈRE SÈCHE À THUYA**
 - Sapinière sèche à thuya
 - SÉRIE DE L'ÉRABLIÈRE À BOULEAU JAUNE**
 - Érablière à bouleau jaune
 - Pessière blanche
 - Tremblée à érable
 - Terres abandonnées
 - Terres cultivées
 - SÉRIE DE LA SAPINIÈRE À ÉPINETTE ROUGE**
 - Sapinière à épinette rouge
 - Pessière blanche
 - Tremblée
 - Bûches récentes
 - Terres abandonnées
 - Terres cultivées
 - SÉRIE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU JAUNE**
 - Sapinière à bouleau jaune
 - Pessière blanche
 - Tremblée
 - Bûches récentes
 - Terres abandonnées
 - Terres cultivées
 - SÉRIE DE LA SAPINIÈRE À ÉPINETTE BLANCHE**
 - Sapinière à épinette blanche
 - Peupleraie boréale
 - Aulnaie verte
 - Terres abandonnées
 - Terres cultivées
 - SÉRIE DE LA FÉNEAIE À ORME**
 - Fénaie à orme
 - Peupleraie boréale
 - Aulnaie américaine
 - Terres abandonnées
 - Terres cultivées
 - SÉRIE DE LA SAPINIÈRE HUMIDE À THUYA**
 - Sapinière humide à thuya
 - Tremblée humide
 - Aulnaie américaine
 - Bûches récentes
 - Terres abandonnées
 - Terres cultivées
 - SÉRIE DE LA CÉDRÈRE TOURBEUSE**
 - Cédrère tourbeuse
 - Tremblée humide
 - Aulnaie américaine
 - Bûches récentes
 - Terres abandonnées
 - Terres cultivées
 - SÉRIE DE LA PESSIÈRE À SPHAGNES**
 - Pessière à sphagnes
 - Pineuse grise
 - Tourbière à éricacées
 - Tourbière exploitée
 - Tourbière à sphagnes
 - Terres abandonnées
 - Terres cultivées
- LIMITES**
 - Série
 - Sole
 - App. densité
- CLASSES D'ÂGE**
 - I < 50 ans
 - II > 50 ans
- CLASSES DE DENSITÉ**
 - 1 < 50%
 - 2 > 50%

